

Resposta da atividade das enzimas urease e arginase à adição de nitrogênio na cultura do milho, sob dois sistemas de manejo do solo no cerrado ⁽¹⁾

Caroline dos Santos Martins Guieiro ⁽²⁾; Bianca Gonçalves Camilo ⁽³⁾; Cássia Naiara Soares Almeida ⁽³⁾; Ketleyn Karolline Barbosa dos Santos ⁽³⁾; Eveline Anielly Cristelli Soares ⁽³⁾; Mônica Matoso Campanha ⁽⁴⁾; Flávia Cristina dos Santos ⁽⁴⁾; Miguel Marques Gontijo Neto ⁽⁴⁾; Christiane Abreu Oliveira Paiva ⁽⁴⁾; Ivanildo Evódio Marriel ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Trabalho executado com recursos da Embrapa, do CNPq e da Fapemig.

⁽²⁾ Estudante do Curso de Engenharia Ambiental; Centro universitário de Sete Lagoas - UNIFEMM; Sete Lagoas, MG; Bolsista PIBIC do Convênio Fapemig – Embrapa.

⁽³⁾ Estudante do curso de engenharia ambiental; Centro universitário de Sete Lagoas - UNIFEMM; Sete Lagoas, MG.

⁽⁴⁾ Pesquisador; Embrapa Milho e Sorgo.

INTRODUÇÃO

As preocupações da comunidade científica e da sociedade em geral em relação às mudanças climáticas, que são problemas interligados de dimensões globais, tornaram-se emergenciais. Portanto, devem ser discutidas alternativas a fim de se desenvolver ações dirigidas para prevenção e controle das emissões de gases de efeito estufa (GEE) (ASSAD, 2015; CAVALCANTI et al., 2014).

O setor agropecuário, em particular no Brasil, é visto como uma das principais atividades antrópicas responsáveis pelas emissões de GEE (BRASIL, 2010), sendo que o uso de fertilizantes nitrogenados responde por parcela significativa deste processo (CARVALHO, 2009). Entretanto, a contribuição da agricultura depende da prática de manejo utilizada (ASSAD, 2015), por exemplo, a aplicação de fertilizante nitrogenado acima da demanda ótima da planta resulta em consequências ambientais significativas em razão de perda de nitrogênio através dos processos de lixiviação e emissão de gases de efeito estufa (NOVOA et al., 2000; MORA et al., 2004; ALFARO et al., 2005, 2006).

De modo geral, a dinâmica de nitrogênio no ambiente é mediada por enzimas de origem microbiana. Dentre estas, destacam-se a urease, responsável pela hidrólise da ureia em dióxido de carbono e amônia, e a arginase, cuja atividade relaciona-se com nitrogênio (N) potencialmente mineralizável no solo (KANDELER; GERBER, 1988; ALEF; KLEINER, 1986).

Segundo Andrews et al. (1989), a análise da arginase representa a população metabolicamente ativa, ou seja, nitrogênio potencialmente disponível às plantas; já a urease representa a população microbiana como um todo, sendo a hidrólise da ureia oriunda da aplicação de fertilizantes ou de ácidos nucleicos presentes no solo, liberando amônia e dióxido de carbono.

O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade das enzimas urease e arginase em solo de cerrado sob dois sistemas de manejo como parte de pesquisa que visa quantificar a emissão de GEE em sistemas agrícolas no Brasil.

Material e métodos

As amostras para análises enzimáticas foram coletadas em experimento instalado em novembro de 2014 em Latossolo Vermelho Distrófico (LVd), na Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, (latitude 19°28'4" S, longitude 44°15'08" W e altitude média de 730 m).

Os tratamentos foram constituídos de: dois sistemas de manejo, plantio direto (SPD) e convencional (SPC), na ausência e presença (SPD SPC e SPDN, SPCN) de adubação nitrogenada, além de área sob cerrado natural utilizado como referência. Os tratamentos foram dispostos em delineamento em blocos casualizados, com três repetições. No plantio foi efetuada uma adubação à base de 400 kg ha⁻¹ da formulação NPK 4-28-16. O nitrogênio em cobertura, 225 kg ha⁻¹, foi aplicado em duas parcelas, aos 27 e 49 dias após o plantio.

Aos 15, 32 e 56 dias após o plantio foram efetuadas coletas de amostras de solo deformadas para análise da atividade das enzimas urease e arginase, na profundidade 0-10 cm. As amostras foram conservadas em geladeira até o momento das análises.

A atividade da urease foi determinada por meio da quantificação de amônio liberado pela hidrólise da ureia utilizando-se o método colorimétrico preconizado por Kandeler e Gerber (1988). Amostras de 0,5 g dos solos amostrados foram tratadas com 0,25 mL de solução de ureia (4,8 g L⁻¹) e incubadas por uma hora a 37 °C. Após a incubação, adicionaram-se 5 ml de solução de KCl, 1 M em cada amostra, que ficaram sob agitação por 30 minutos. Uma alíquota de 100 µL do sobrenadante de cada amostra foi retirada e misturada a 1,0 mL da solução de reagentes para colorimétrica. Após sessenta minutos, realizou-se a leitura no espectrofotômetro a 660 nm.

A atividade da arginase foi determinada por meio da quantificação de amônio liberado pela hidrólise da arginina utilizando-se o método colorimétrico de Alef e Kleiner (1986). Amostras de 1,0 g solo foram tratadas com 0,25 mL de solução de L-arginine (0,2 g L⁻¹) e incubadas por uma hora, a 37 °C. Após a incubação, adicionaram-se 4 mL de solução de KCl, 1 M em cada amostra que ficou sob agitação por 30 minutos. Uma alíquota de 100 µL do sobrenadante de cada amostra foi retirada e misturada a 1,0 mL da solução de reagentes para análise colorimétrica. Após sessenta minutos, realizou-se a leitura no espectrofotômetro a 660nm.

Os dados obtidos, expressos em µg N-NH⁴⁺ h⁻¹ g⁻¹ de solo, foram comparados por meio do teste de TUKEY, ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o programa de estatística SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos para a atividade da enzima urease em amostras de solo sob sistema de plantio direto e convencional, em diferentes épocas de avaliação, estão apresentados na Figura 1. Os valores variaram de 132,80 µg N-NH⁴⁺ h⁻¹ g⁻¹ solo a 2.036,6 µg N-NH⁴⁺ h⁻¹ g⁻¹ solo. Observou-se que a atividade desta enzima apresentou variação significativa (P≤0,05) em função de manejo, nitrogênio e época, bem como para as interações entre esses fatores.

Entretanto, independentemente do tipo de manejo, notou-se que a influência do nitrogênio aplicado em cobertura sobre a urease apresentou diferença significativa somente aos 56 dias após o plantio. Vale salientar que a resposta da enzima ao aumento da disponibilidade de N foi observada a partir do quinto dia após a aplicação da primeira parcela de N, aos 32 dias após o plantio. Esse resultado, em parte, pode ser explicado pela época de aplicação da adubação nitrogenada. Por outro lado, em ambos os sistemas de manejo, convencional e plantio direto, não se detectaram diferenças entre épocas, na ausência da adubação nitrogenada.

A atividade da arginase apresentou comportamento semelhante à atividade da urease, sendo influenciada pela adição da adubação nitrogenada a partir do quinto dia após a primeira adubação de cobertura e com variação significativa apenas na última época

avaliada (Figura 2). Contudo, a atividade dessa enzima apresentou valores em torno de quatro vezes inferiores aos encontrados para a urease (Figura 2).

Quando se compararam os diferentes sistemas de manejo com o cerrado, considerado como o ecossistema de referência, foram encontrados acréscimo para a atividade da urease, variando de 27% a 116%, nos agroecossistemas, aos 15 e 32 dias.

Os resultados sugerem um comportamento indutivo para ambas as enzimas, uma vez que houve resposta significativa da atividade enzimática ao aumento da disponibilidade de nitrogênio. É sabido que alteração na atividade da urease pode ser usada como indicador indireto da variação no *pool* do nitrogênio potencialmente disponível no solo. Do mesmo modo é bem conhecido que a atividade da urease é influenciada por vários fatores, incluindo tipo do solo, teor de matéria orgânica, umidade, pH, temperatura e principalmente a quantidade de nitrogênio adicionada (YADAV et al., 1987; CABRERA et al., 2005; WANG et al., 2004).

Esse fato torna-se importante, uma vez que a melhor compreensão do processo de mineralização do fertilizante nitrogenado na fase de ureia contribui para o desenvolvimento de estratégia para aumentar a eficiência do uso de fertilizante nitrogenado e minimizar seu impacto negativo no ambiente (CARTES et al., 2009).

Conclusões

As atividades das enzimas urease e arginase respondem ao aumento da disponibilidade nitrogênio, independentemente do sistema de manejo.

Houve resposta da atividade de ambas as enzimas ao aumento do suprimento de nitrogênio, dependendo da época de aplicação.

Agradecimentos

AGRADECEMOS À EMBRAPA MILHO E SORGO, AO CNPQ E À FAPEMIG, PELO APOIO FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO.

Referências

ALEF, K.; KLEINER, D. Arginine ammonification, a simple method to estimate microbial activity potential in soils. **Soil Biology and Biochemistry**, Oxford, v. 18, p. 233-235, 1986.

ALFARO, M.; SALAZAR, F.; IRAIRA, S.; TEUBER, N.; RAMÍREZ, L. Nitrogen runoff and leaching losses in beef production systems under two different stocking rates in Southern Chile. **Gayana Botánica**, v. 62, n. 2, p. 130-138, 2005.

ALFARO, M. V.; SALAZAR, F. S.; ENDRESS, D. B.; DUMONT, J. C. L.; VALDEBENITO, A. B. Nitrogen leaching losses on a volcanic ash soil affected by the source of fertiliser. **Journal of Soil Science and Plant Nutrition**, Tokyo, v. 6, n. 2, p. 54-63, 2006.

ANDREWS, R. K.; BLAKERLEY, R. L.; ZERNER, B. Urease: a Ni (II) metalloenzyme. In: LANCASTER, J. R. (Ed.). **The biorganic chemistry of nickel**. New York: VCH Publisher, 1989. p. 141-166.

ASSAD, E. D. **ABC- Observatório Agricultura de Baixo Carbono**: agricultura de baixa emissão de carbono: a evolução de um novo paradigma. Disponível em: <https://s3-sa-east1.amazonaws.com/arquivos.gvces.com.br/arquivos_gvces/arquivos/275/abc_novopa_radgima_completo.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2015.

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. **Inventário brasileiro das emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa**: informações gerais e valores preliminares. Brasília, 2010. Disponível em: <http://ecen.com/eee75/eee5p/inventario_emissoes_brasil.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2015.

CABRERA, M. L.; KISSEL, D. E.; VIGIL, M. F. Nitrogen mineralization from organic residues: research opportunities. **Journal of Environmental Quality**, Madison, v. 34, p. 75-79, 2005.

CARTES, P.; JARA, A. A.; DEMANET, R.; MORA, M. L. Urease activity and nitrogen mineralization kinetics as affected by temperature and urea input rate southern Chilean andisols. **Soil Science and Plant Nutrition**, Tokyo, v. 9, p. 69-82, 2009.

CARVALHO, G. D. Agricultura e aquecimento global: efeitos e mitigação. **Enciclopédia Biosfera**, Goiânia, v. 5, n. 8, p. 127-145, 2009. Suplemento.

CAVALCANTE, E.; OLIVEIRA, W. R. D.; CARVALHO, A. M.; SILVA, R. R.; TIMÓTEO, L. G.; COSER, T. R.; RAMOS, M. L. G.; CARNEIRO, R.; MELO, C.; ZANSÁVIO, A. M. O. Emissão de N₂O em sistemas de integração lavoura pecuária-floresta e integração lavoura pecuária. In: CONGRESO LATINOAMERICANO DE LA CIENCIA DEL SUELO, 20.; CONGRESO PERUANO DE LA CIENCIA DEL SUELO, 16., 2014, Cusco. **Educar para preservar el suelo y conservar la vida en la tierra**: [anales]. Cusco: Sociedade Latinoamericana de la Ciencia del Suelo: Sociedade Peruana de la Ciencia del Suelo, 2014.

KANDELER, E.; GERBER, H. Short-term assay of soil urease activity using colorimetric determination of ammonium. **Biology and Fertility of Soils**, Berlin, v. 6, p. 68-72, 1988.

MORA, M. L.; ORDONEZ, C.; CARTES, P.; VISTOSO, E.; PINO, J.; JARA, A.; DEMANET, R. Reciclaje de nitrógeno proveniente de purines en una pastura de Lolium perenne L. In: MORA M. L. **Residuos orgánicos y su uso en sistemas agroforestales**. Temuco: Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo: Universidad de La Frontera, 2004. p. 243-256. Simposio de las Ciencias del Suelo.

NOVOA, S. A.; GONZALEZ, R.; NOVOA, S.; ROJAS, R. Inventario de gases com efecto emitidos por la actividad agropecuária chilena. **Agricultura Técnica**, v. 60, n. 2, p. 154- 165, 2000.

WANG, W. J.; SMITH C. J.; CHEN, D. Predicting soil nitrogen mineralization

dynamics with a modified double exponential model. **Soil Science Society of America Journal**, Madison, v. 68, p. 1256-1265, 2004.

YADAV, D. S.; KUMAR, V.; SINGH, M.; RELAN P. S. Effect of temperature and moisture on kinetics of urea hydrolysis and nitrification. **Australian Journal of Soil Research**, Melbourne, v. 25, p. 185-191, 1987.




Figura 1 - Atividade da urease em amostras de solo de cerrado sob plantio direto (SPD) e plantio convencional (SPC) com e sem N em cobertura (C/N e S/N), em três épocas. Valores médios de três repetições.




Figura 2 - Atividade da arginase em amostras de solo de cerrado sob plantio direto (SPD) e plantio convencional (SPC) com e sem N em cobertura (C/N e S/N), em três épocas. Valores médios de três repetições.