



IV CONAC

CONGRESSO NACIONAL DE

FEIJÃO-CAUPI

FEIJÃO-CAUPI:

AVANÇOS E DESAFIOS TECNOLÓGICOS E DE MERCADOS

RESUMOS



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Meio-Norte
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

RESUMOS

IV Congresso Nacional de Feijão-caupi

Feijão-caupi: avanços e desafios tecnológicos e de mercados

Sorriso - MT, 7 a 10 de junho de 2016

Embrapa Meio-Norte

Av. Duque de Caxias, 5.650, Bairro Buenos Aires
Caixa Postal 01
CEP 64.008-780, Teresina, PI
Fone: (86) 3198-0500
Fax: (86) 3198-0530
www.embrapa.br/meio-norte
www.embrapa.br/fale-conosco/sac

Unidade responsável pelo conteúdo e edição

Embrapa Meio-Norte

Revisores Técnicos

Alcido Elenor Wander - Embrapa Arroz e Feijão
Candido Athayde Sobrinho - Embrapa Meio-Norte
Edson Alves Bastos - Embrapa Meio-Norte
Jorge Minoru Hashimoto - Embrapa Meio-Norte
José Ângelo Nogueira de Menezes Júnior -
Embrapa Meio-Norte
Maurisrael de Moura Rocha - Embrapa Meio-Norte

Catálogo: *Orlane da Silva Maia*

Ilustração, arte e diagramação: *F&B Eventos*

1a edição

Publicação digitalizada (2016)

Revisores Ad hoc

Abner José de Carvalho – Universidade Estadual de Montes Claros
Aderson Soares de Andrade Júnior – Embrapa Meio-Norte
Agenor Martinho Correa – Universidade Estadual do Mato Grosso
Alberto Soares de Melo – Universidade Estadual da Paraíba
Aloisio Alcantara Vilarinho – Embrapa Roraima
Ana Paula Encide Olibone – Instituto Federal do Mato Grosso
André Rodrigues dos Reis – Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”
Braz Henrique Nunes Rodrigues – Embrapa Meio-Norte
Cândida Hermínia Campos de Magalhães Bertini – Universidade Federal do Ceará
Carlos César Pereira Nogueira – Embrapa Meio-Norte
Cícero Nicolini – Universidade Estadual do Piauí
Dácio Olibone – Instituto Federal do Mato Grosso
Diógenes Manoel Pedrosa de Azevedo – Embrapa Meio-Norte
Edvaldo Sagrilo – Embrapa Meio-Norte
Emanuel da Silva Cavalcante – Embrapa Amapá
Everaldo Moreira da Silva – Universidade Federal do Piauí
Flávio Fávaro Blanco – Embrapa Meio-Norte
Francisco de Brito Melo – Embrapa Meio-Norte
Francisco José de Seixas Santos – Embrapa Meio-Norte
Ildon Rodrigues do Nascimento – Universidade Federal do Tocantins
Inocencio Junior de Oliveira – Embrapa Amazônia Ocidental
João Elias Lopes Fernandes Rodrigues – Embrapa Amazônia Oriental
José Almeida Pereira – Embrapa Meio-Norte
José Alves da Silva Câmara – Embrapa Meio-Norte
José Lopes Ribeiro – Embrapa Meio-Norte
José Oscar Lustosa de Oliveira Júnior – Embrapa Meio-Norte
José Roberto Antoniol Fontes – Embrapa Amazônia Ocidental
Júlio César do Vale Silva – Universidade Federal do Ceará
Lúcio Flavo Lopes Vasconcelos – Embrapa Meio-Norte
Marcos Eric Barbosa Brito – Universidade Federal de Campinas Grande
Mariana Aparecida Carvalhaes – Embrapa Meio-Norte
Milton José Cardoso – Embrapa Meio-Norte
Paulo Fernando de Melo Jorge Vieira – Embrapa Meio-Norte
Paulo Henrique Soares da Silva – Embrapa Meio-Norte
Ranyse Barbosa Querino da Silva – Embrapa Meio-Norte
Ricardo Montalvan Del Águila – Embrapa Meio-Norte
Rosa Maria Cardoso Mota de Alcantara – Embrapa Meio-Norte
Ueliton Messias – Embrapa Meio-Norte
Valdenir Queiroz Ribeiro – Embrapa Meio-Norte

Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Embrapa Meio-Norte

Congresso Nacional de Feijão-caupi (4 : 2016 : Sorriso, MT).

Feijão-caupi: avanços e desafios tecnológicos e de mercados: resumos / IV Congresso Nacional de Feijão-caupi, Sorriso, MT, 7 a 10 de junho de 2016. – Brasília, DF: Embrapa, 2016. 269 p.

Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader.

Modo de acesso:

<<http://www.cpamn.embrapa.br/conac2016/downloads/EBOOK.pdf>>

Título da página da Web (acesso em 11 ago. 2016).

ISBN 978-85-7035-616-1

1. Feijão de corda. 2. *Vigna unguiculata*. I. Título. II. Embrapa Meio-Norte.

CDD 635.6592

Embrapa 2016

Competição e avaliação de cultivares de feijão-caupi de portes semiereto e ereto na região Bragantina do Pará

Competition and evaluation of erect and semi-erect cowpea cultivars in Pará Bragantina region

João Elias Lopes Fernandes Rodrigues⁽¹⁾, Sonia Maria Botelho⁽¹⁾, Francisco Rodrigues Freire-Filho⁽¹⁾, Raimundo Nonato Guimarães Teixeira⁽¹⁾, María Carolina Sarto Fernandes Rodrigues⁽²⁾, Thésio Nirlando Afonso dos Santos⁽³⁾ e José Pio de Miranda Júnior⁽³⁾

⁽¹⁾ Embrapa Amazônia Oriental, Caixa Postal 48, CEP 66095-100 Belém, PA. E-mail: joao.rodrigues@embrapa.br, sonia.botelho@embrapa.br, francisco.freire-filho@embrapa.br, raimundo.teixeira@embrapa.br

⁽²⁾ Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Av. Pres. Tancredo Neves, 2501, CEP 66077-830 Belém, PA. E-mail: mariasarto@hotmail.com

⁽³⁾ Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER/PA, Rodovia BR 316, Km 12, CEP 67105-970 Marituba, PA. E-mail: thessyo@hotmail.com, mirandajunior.josepio@gmail.com

O feijão-caupi é cultivado no estado do Pará por agricultores familiares, utilizando cultivares tradicionais de baixa produtividade. A competição e avaliação de cultivares melhoradas, para identificar materiais genéticos superiores, quanto à produtividade e aceitação comercial, proporcionam ganhos significativos no consumo e na renda familiar pela comercialização do excedente de produção. Este trabalho objetivou avaliar e selecionar cultivares de feijão-caupi de portes semiereto e ereto com potencial de cultivo na região Bragantina. Os ensaios foram conduzidos no município de Bragança, sendo avaliadas quatro cultivares melhoradas (BRS Guariba, BRS Cauamé, BRS Tumucumaque e BRS Itaim) e duas regionais (São Benedito e Manteiguinha), em Latossolo Amarelo distrófico, adubado com 300 kg ha⁻¹ da fórmula comercial (10:28:20), quinze dias após a germinação. O delineamento experimental foi blocos casualizados com seis tratamentos e quatro repetições. A parcela experimental constou de quatro linhas de 5,0 m de comprimento, com espaçamento de 0,50 m entre linhas e 0,25 m entre plantas, sendo as duas linhas centrais avaliadas como área útil. Aos 79 dias após plantio, quando estavam completamente secas, as vagens foram colhidas manualmente e os grãos pesados, sendo a produtividade das parcelas aferida para kg ha⁻¹. As cultivares BRS Cauamé (1.705 kg ha⁻¹), BRS Tumucumaque (1.701 kg ha⁻¹), São Benedito (1.513 kg ha⁻¹), BRS Itaim (1.313 kg ha⁻¹) e Manteiguinha (1.282 kg ha⁻¹) embora com desempenho inferior ao da BRS Guariba (2.231 kg ha⁻¹), podem ser recomendadas para cultivo nas condições edafoclimáticas da região Bragantina, pois apresentaram produtividade superior à média do Pará (695 kg ha⁻¹).

Palavras-chave: *Vigna unguiculata*, potencial produtivo, agricultura familiar.