

Volume 4, número 1
maio, 1986

horticultura

brasileira

Revista da
Sociedade de Olericultura do Brasil

ISSN 0102-0536



HORTICULTURA BRASILEIRA
v.4, n.1, MAI 1986.



454 - 20

AValiaÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CULTIVARES, DE ALHO NO ESTADO DE RONDÔNIA. FONSECA, A.F.A. da & ANGELETTI, M.da.P. (UEPAE de Porto Velho/EMBRAPA, C.P. 406, 78900, Porto Velho, RO); COLTRI, M.L. (UEPAE Manaus/EMBRAPA, C.P. 455, 69.000, Manaus-AM).

Avaliou-se o comportamento de 13 cultivares de alho em Rondônia. O experimento foi instalado no município de Vilhena, no sul do Estado, com altitude de 610 m, em um Latossolo Vermelho Amarelo, originalmente sob vegetação de cerrado. Utilizou-se um delineamento em blocos ao acaso, com 13 tratamentos (cultivares) e 3 repetições. Cada parcela (3 x 1 m) foi composta por 90 plantas, num espaçamento de 0,3 x 0,1 m. O plantio foi realizado em 12.06.85 e a colheita em 15.10 e 30.10.85, conforme o ciclo das diferentes cultivares. Trinta dias após a colheita, foram tomados os dados de rendimento, peso médio de bulbos e bulbilhos, bem como o nº de bulbilhos/bulbos. Os três últimos parâmetros foram avaliados a partir de uma amostra de 10 bulbos. Destacaram-se as cultivares Cateto Roxo, Cajuru e Peruano, com rendimentos de 4.697, 4.487 e 4.090 Kg/ha, respectivamente. A cultivar Cajuru apresentou o maior peso médio de bulbos e de bulbilhos, contudo apresentou perdas relativamente elevada durante armazenamento por 30 dias após o tolete.