

OCORRÊNCIA DE Parasierola sp. (HYMENOPTERA, BETHYLIDAE), PARASITÓIDE DA TRAÇA DO TOMATEIRO, NO SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO. (OCCURRENCE OF Parasierola sp. (HYMENOPTERA, BETHYLIDAE), PARASITOID OF TOMATO LEAFMINER, IN THE BRAZILIAN SEMI-ARID REGION. HAJI, F.N.P.¹ SOUSA JÚNIOR, P. R. de.² MIRANDA, I. da G.³ & DINIZ, R.S.⁴. ¹EMBRAPA-CPATSA, Caixa Postal 23, 56300-000-Petrolina, PE; ²Bolsista FACEPE; ³Bolsista VALEXPORT; ⁴Assistente Pesquisa.

Em levantamento realizado em julho de 1993, na cultura do tomate, cultivar IPA-5, em área de manejo da traça do tomateiro Scrobipalpuloides absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae), campo de agricultor em Petrolina, PE, constatou-se a ocorrência de Parasierola sp. (Hymenoptera, Bethylidae), parasitando a lagarta de S. absoluta, praga-chave do tomateiro na região semi-árida brasileira.

Simposio de Controle Biológico, 4., 1994, Gramado. Anais:
Sessão de posters. : EMBRAPA-CPACT, 1994. p. 294.
(EMBRAPA-CPACT. Documentos, 5).