

## TEORES DE MATÉRIA SECA E PROTEÍNA BRUTA EM FORRAGEIRAS NO ESTADO DO AMAZONAS\*

Acilino do Carmo Canto  
Leopoldo Brito Teixeira  
Nelson Nogueira Barros  
Edson Camara Italiano

Com o propósito de se determinar os teores de matéria seca e de proteína bruta das plantas forrageiras existentes no Estado do Amazonas, foram coletadas amostras representativas de pasto em 13 propriedades do Município de Manaus e 9 do Município de Itacoatiara, durante os meses de março a junho de 1976. A amostragem do material foi feita ao acaso, percorrendo-se o pasto em várias direções, retirando-se subamostras com a mão (tentando-se imitar ao máximo o corte efetuado pela boca do animal), semelhantes àquelas que os animais estavam pastando. Constatou-se, para o Município de Manaus, uma predominância das gramíneas Brachiaria decumbens, Gramalote (Axonopus sp), Grama Cheirosa (Homolepes aturensis), Setária (Setaria anceps) e Brachiaria humidicola. Ressalta-se que o Gramalote e a Grama Cheirosa são nativas da região. No Município de Itacoatiara predomina o Colonião (Panicum maximum), vindo logo a seguir, o Brachiaria humidicola, Setária e Brachiaria decumbens.

---

\*Trabalho realizado pela EMBRAPA — UEPAE de Manaus.