Anais da LXI (61ª) Reunião Anual
da Sociedade InterAmericana
de Horticultura Tropical – ISTH

Annals of LXI (61^a) Annual Meeting
of the InterAmerican Society
for Tropical Horticulture – ISTH

Anales de la LXI (61st) Reunión Anual
de la Sociedad InterAmericana
de Horticultura Tropical – ISTH

23 a 27 de novembro de 2015
Manaus, Amazonas, Brasil

*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Brazilian Agricultural Research Corporation
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria*

*Embrapa Amazônia Ocidental
Embrapa Western Amazonia
Embrapa Amazonia Occidental*

*Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento*

*Sociedade InterAmericana de Horticultura
InterAmerican Society for Tropical Horticulture
Reunión Anual de la Sociedad InterAmericana de
Horticultura Tropical*

**Anais da LXI (61^a) Reunião Anual da Sociedade
InterAmericana de Horticultura Tropical – ISTH**

**Annals of LXI (61^a) Annual Meeting of the InterAmerican
Society for Tropical Horticulture – ISTH**

**Anales de la LXI (61st) Reunión Anual de la Sociedad
InterAmericana de Horticultura Tropical – ISTH**

**Embrapa
Brasília, DF
2015**

Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na / Adquirido en / Copies can be purchased from:

**Embrapa Amazônia Ocidental / Embrapa Amazonia
Occidental / Embrapa Western Amazon**

Rodovia AM 010, Km 29, Estrada Manaus/Itacoatiara

Caixa Postal 319 / PO Box 319

Fone / Teléfono / Phone: (92) 3303-7800

Fax: (92) 3303-7820

www.embrapa.br

www.embrapa.br/fale-conosco/sac/

**Unidade responsável pelo conteúdo e pela edição /
Unidad responsable por el contenido y edición / Unit
responsible for the content and editing**

Embrapa Amazônia Ocidental / Embrapa Amazonia
Occidental / Embrapa Western Amazon

Normalização bibliográfica / Normalización bibliográfica /
Bibliographic normalization: *Maria Augusta Abtibol Brito
de Sousa*

Diagramação / Diseño / Layout: *Gleise Maria Teles de
Oliveira*

Capa / Portada / Cover: *Gleise Maria Teles de Oliveira*

Ilustração da capa / Ilustración de la portada / Cover
illustration: *Lúcio Rogério Bastos Cavalcanti*

Tradutores / Traductores / Translators: *Ana Beatriz Fiuza,
Edson Barcelos*

1ª edição / 1ª edición / 1st edition

1ª impressão / Primera impresión / 1st impression (2015):
350 exemplares / copias / copies

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e de inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte,
constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610).

**CIP-Brasil. Catalogação-na-publicação
Embrapa Amazônia Ocidental**

Reunião Anual da Sociedade InterAmericana de Horticultura Tropical (61. : 2015: Manaus, AM).

Anais... / LXI Reunião Anual da Sociedade InterAmericana de Horticultura Tropical. – Brasília, DF : Embrapa, 2015.

148 p. ; 27 cm.

Texto em português, inglês e espanhol.

ISBN 978-85-7035-522-5

1. Horticultura tropical - Congresso. 2. Fruticultura tropical - Congresso. 3. Floricultura tropical – Congresso. 4. Olericultura tropical - Congresso. I. Título. II. Título: Annals of the LXI Annual Meeting of the InterAmerican Society of Tropical Fruits. III. Título: Anales de la LXI Reunión Anual de la Sociedad InterAmericana de Horticultura Tropical.

CDD 635

HT033: MANEJO E CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE ACELGA (*Beta vulgaris* var. *cicla*) MINIMAMENTE PROCESSADA

Sandy Santos da Fonseca¹; Alex Guimarães Sanches²; Elaine Gleice Silva Moreira²; Jaqueline Macedo Costa²

¹Discente do 7º período do curso de Engenharia Agrônômica, UFPA/Campus Universitário de Altamira, Av. Senador José Porfírio, 515, São Sebastião, CEP: 68.37-040, Altamira; ²Engenheiros Agrônomos, e-mail para correspondência: sandy51911@hotmail.com

A acelga (*Beta vulgaris* var. *cicla*) é uma hortaliça folhosa que apresenta poucos estudos sobre suas características pós-colheita, assim o presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da temperatura de armazenamento e da embalagem na sua conservação. Acelgas da variedade Lucullus Gigante foram cortadas em tiras de 5 cm e acondicionadas em bandejas de isopor de poliestireno revestida com filme plástico de PVC e em embalagem de tereftalato (PET) e armazenadas a 5°C e a 10 °C por 10 dias. Em intervalos de dois dias avaliaram-se: teor de clorofila, perda de massa fresca, teor relativo de água, sólidos solúveis, acidez titulável, murchamento, sabor e aparência. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial (2x2x6) sendo duas temperaturas, duas embalagens e seis períodos de avaliação com cinco repetições e a parcela experimental composta por bandejas de 100 g. Os dados foram submetidos à análise de variância, teste Tukey a 5% de probabilidade e regressão. Não houve efeito significativo das embalagens ou do tempo no teor de clorofila das folhas, independente do tratamento, as folhas permaneceram verdes durante todo o tempo de avaliação. Nas folhas armazenadas a 10 °C houve maior perda de massa fresca devido à evaporação da água absorvida e acumulada na superfície das folhas durante o armazenamento. A embalagem PET foi efetiva no teor relativo de água em ambas as temperaturas de armazenamento. O conteúdo de sólidos solúveis e o murchamento foram afetados somente pelo fator temperatura e tempo de armazenamento, a temperatura a 10 °C apresentou os melhores resultados. Foi verificada incidência de injúrias pelo frio quando armazenadas a 5 °C na embalagem bandeja de isopor comprometendo assim sua aparência e sabor. Recomenda-se o armazenamento da acelga minimamente processada a temperatura de 10 °C na embalagem PET por garantir as características químicas e sensoriais até o 8º dia de armazenamento.

Palavras-chave: atmosfera modificada; folhosa; qualidade.

HT003: MASSA SECA E MICRONUTRIENTES NO COENTRO COM DOSES DE BIOFERTILIZANTE

Rodrigo Fascin Berni; Marinice Oliveira Cardoso; Isaac Cohen Antonio; Cristiani Kano

Embrapa Amazônia Ocidental, Rodovia AM 010, Km 9, C. Postal 319, 69070-970 Manaus, AM; rodrigo.berni@embrapa.br; marinice.cardoso@embrapa.br; isaac.cohen@embrapa.br; cristiani.kano@embrapa.br

Objetivou-se estudar o efeito de doses de um biofertilizante formulado com partes herbáceas de *Flemingia macrophylla*, folhas de *Musa* sp e folhas e raízes de *Azolla* sp, além de fontes minerais (BMV), no coentro (*Coriandrum sativum*), cv. Verdão. O experimento foi conduzido (17/7/13 a 27/8/13) na Embrapa Amazônia Ocidental (Iranduba-AM), em Argissolo Amarelo textura média (V% = 36,4), sob cobertura com filme plástico transparente (capela). O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com seis repetições (0,75 m²). Além das doses do BMV (% em água: zero; 5; 10; 15 e 30), utilizou-se um tratamento adicional: biofertilizante de esterco bovino (BEB, 10% em água). Aplicou-se esterco de galinha (1,5 kg m⁻²), em base. As respostas às doses foram lineares. A massa seca da parte aérea (MS) incrementou (0% – 30%: 11,9 a 13,75 g 100gMV⁻¹), o que foi associado com hastes fibrosas, por insuficiência de N, que influenciou negativamente a massa verde (MV) total. Nos acúmulos de micronutrientes (mg 100 gMV⁻¹ da parte aérea) ocorreram (de 0 % a 30%): aumentos - 0,095 a 3,18 (B), que foi expressivo; 0,4051 a 0,5881 (Zn); 0,1068 a 0,1308 (Cu); decréscimo - 9,7538 a 6,8558 (Fe); e efeito nulo – média igual a 0,6431 (Mn). Como o BMV recebeu micronutrientes, exceto Fe, esses incrementos são consequentes. Alterações no pH e nas concentrações de P e Ca, em razão da adição de fosfato natural Arad no BMV, podem explicar o decréscimo de Fe. O Mn teve extração inferior à de Fe. Por contraste, o BEB (12,25 g 100 gMV⁻¹) não diferiu do BMV (11,90 g 100 gMV⁻¹), em MS. Os ingredientes vegetais e as fontes de minerais dos biofertilizantes devem ser objeto de estudos mais apurados.

Palavras-chave: *Coriandrum sativum*; adubação orgânica; aquisição de nutrientes.

Agência financiadora: Fapeam.