



Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015.  
ISSN 2316-7637

# **ANAIS**

## **Resumos Aprovados – 2015**

**ISSN: 2316-7637**



**Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e  
Tecnologia**  
**18, 19 e 20 de novembro de 2015**

## **VOUACAPOUA AMERICANA AUBL. (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE), NO HERBÁRIO IAN (EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL)**

<sup>1</sup>José Claudio Castilho Alves, <sup>2</sup>João Vitor Moraes Jaques, <sup>3</sup>Raimundo Luiz Moraes de Sousa, <sup>3</sup>Ana Luísa Fares Biondi Lima <sup>4</sup>Sebastião Ribeiro Xavier Júnior,

<sup>1</sup>Graduando em Engenharia Florestal. Universidade do Estado do Pará.  
joseclaudio.castilho@gmail.com

<sup>2</sup>Graduando em Engenharia Florestal. Universidade do Estado do Pará.

<sup>3</sup>Graduando em Licenciatura – Ciências Biológicas. Universidade da Amazônia

<sup>4</sup>Biólogo. Analista B da Embrapa Amazônia Oriental

### **RESUMO**

Vouacapoua pertence à família Leguminosae-Caesalpinioideae, essencialmente amazônico, encontrado em mata de terra firme. Abrange três espécies aceitas (*V. americana* Aubl., *V. macropetala* Sandwith e *V. pallidior* Ducke) e encontra-se distribuída nas Guianas e na Amazônia brasileira. No estado do Pará, Vouacapoua Aubl., em especial a *V. americana*, apresenta um elevado valor comercial devido ao seu uso na construção civil e na indústria moveleira, em razão disso a espécie é bastante explorada na região amazônica. Assim, com vista a mapear a distribuição geográfica e o conhecimento desta na Amazônia, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento de *V. americana* no Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental. O Estudo foi realizado no Herbário IAN (Embrapa Amazônia Oriental) utilizando o banco de dados do acervo, através do BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management System) foram conferidas e corrigidas todas as informações relacionadas à espécie com base nas etiquetas, imagens das exsicatas e também utilizou-se sites como Mobot, Flora do Brasil e IBGE quando necessário. O herbário apresenta 180 exemplares de *V. americana*, sendo os coletores Ribeiro, B.G.S (36 exemplares), Carmo, N.A.S. do, (27), Soler, J.G, (22), e Pires, J.M., (17 exemplares) os que mais contribuíram com a coleção da espécie no herbário. Os municípios que apresentaram maior quantidade de coletas foram Mojú (117 amostras), Belém (25), Novo Repartimento (7), Paragominas (6) e Tailândia (5 amostras). Os dados desta pesquisa vão subsidiar estudos em fitogeografia, ecologia e taxonomia que podem contribuir no melhor entendimento desta espécie, bem como seu uso, importância e manejo na Amazônia.

**Palavras-chave:** Acapú. Acervo. BRAHMS.

**Área de Interesse do Simpósio:** Divulgação Científica