

# Levantamento das técnicas zootécnicas utilizadas na criação de bezerras leiteiras no município de Rio Pomba, MG

---

*Paulo Campos Martins<sup>1</sup>, Mariana Magalhães Campos<sup>2</sup>, Cristiano Gonzaga Jayme<sup>3</sup>, Fernanda Samarini Machado<sup>2</sup>, Thierry Ribeiro Tomich<sup>2</sup>, Luiz Gustavo Ribeiro Pereira<sup>2</sup>, Rafael Brugger e Silva<sup>4</sup>, Wellington Luiz de Paula Araújo<sup>4</sup>*

<sup>1</sup>Bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica da Fapemig (PIBIC/Fapemig).

E-mail: paulo.camp@hotmail.com

<sup>2</sup>Pesquisador da Embrapa Gado de Leite

<sup>3</sup>Professor do Departamento de Zootecnia do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba

<sup>4</sup>Graduando em Zootecnia do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba

Agradecimentos: Fapemig

## Resumo

O levantamento de dados e das necessidades específicas da atividade leiteira são ferramentas importantes na tomada de decisões por parte dos gestores. Objetivou-se identificar técnicas de manejo utilizadas na criação de bezerras leiteiras por produtores do município de Rio Pomba, MG. O estudo foi conduzido em 40 propriedades do município, onde os produtores entrevistados foram escolhidos de forma aleatória, não considerando tamanho da propriedade, grau de instrução ou renda. Foi aplicado questionário contendo perguntas simples e objetivas, visando identificar as técnicas zootécnicas (escolha de touros, pasto maternidade, acompanhamento do parto, fornecimento do colostro, cura de umbigo, forma de desmame, acompanhamento do desenvolvimento e escrituração zootécnica) adotadas pelos produtores na condução da atividade. O resultado do levantamento demonstrou que 82,5% dos produtores escolhem touros visando aproveitar os machos para serem recriados; apenas 5% adotam pasto maternidade; 7,5% acompanham parto quando o mesmo ocorre durante o dia; 100% dos produtores fornecem colostro diretamente na vaca, auxiliando a cria apenas quando a vaca é levada para o curral; 70% fazem a cura do umbigo sendo deste total 30% com solução de iodo (10%), o desmame é feito em 80% das propriedades após os seis meses de idade e 27,5% fazem escrituração zootécnica. Diante deste contexto, constata-se que a condução da atividade por parte dos produtores da região avaliada não é realizada seguindo os critérios técnicos hoje preconizados, sendo assim, muito pode ser feito na criação de bezerras do município, visando obter uma criação com maior produtividade e possivelmente com maior retorno financeiro.

**Palavras-chave:** bovinocultura, cria, diagnóstico, manejo, neonatos