

EMBRAPA - CPAA  
Biblioteca

R  
632.  
C749n  
1994  
v. 3

3427

# XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA

RESUMOS  
Volume 3

Salvador - Bahia  
27.11 a 02.12.94



A2435/93

S.E.L. da SILVA\*, A. das G.C. de SOUZA\*

\*Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental/CPAA. EMBRAPA, C.P. 319, CEP 69048-660, Manaus-AM.

Determinadas espécies de fruteiras nativas apresentam grandes perspectivas de comercialização, seja ao estado natural ou industrializado. Contudo, número elevado de espécies é conhecido apenas nas áreas produtoras. Algumas já tem o seu potencial conhecido, porém não desenvolvido, como o bacuri, o taperebá e o murici. Outras tem potencial por sua similaridade com frutas já exploradas, como araca-pera e mapati, ou por sua popularidade na região ou microrregião como abiu, biribá, sapota ou ainda pelo seu valor nutricional como o camu-camu. Com o objetivo de colecionar, avaliar o potencial produtivo e de multiplicar material propagativo, iniciou-se uma coleção de fruteiras regionais e exóticas em 1989, que atualmente consta de 38 diferentes espécies, cada uma representada por 10 indivíduos plantados em linha. As espécies já introduzidas são: Abiu (*Pouteria caimito* (Ruiz & Pav.) Radlk; Abriçó (*Mammea americana* L. et Jacq.); Acerola (*Malpighia puniceifolia* L.); Araça-boi (*Eugenia stipitata* McVaugh); Araticum (*Annona senegalensis* Pers.); Bacuri (*Platonia insignis* Mart.); Bacuripari (*Reedia macrophylla* (Mart) P.L. et Triana); Cacaumelão (*Theobroma bicolor* H&B); Cagaita (*Cagaita dysenterica* DC); Caju (*Anacardium occidentale* L.); Camu-camu (*Myrciaria dubia* (Kunth.) McVaugh); Canistel (*Pouteria campechiana* (Kunth.) Baehnia); Carambola (*Averrhoa carambola* L.); Cupuí (*Theobroma subincanum* Mart.); Dovialis (*Dovialis hebecarpa* Merr.); Flacourtia (*Flacourtia jangomas* Merr.); Genipapo (*Genipa americana* L.); Goiaba (*Psidium guajava* L.); Goiaba Italiana (*Psidium Friedrichsthalianum* L.); Graviola (*Annona muricata* L.); Ingá (*Ingá edulis* Mart.); Ingá-Peba (*Inga macrophylla* Kunth); Jambo Rosa (*Eugenia jambosa* DC); Jaca (*Artocarpus integrifolia* Lam. F.); Jujuba (*Zyzyphus jujuba* Juss.); Longana (*Euphoria longana* Lamk); Macadâmia (*Macadamia integrifolia* L.S. Smith); Mangostão (*Garcinia mangostana* L.); Pitanga (*Eugenia uniflora* L.); Pitomba (*Talisia esculenta* (St Hil.) Radlk); Puruí (*Alibertia edulis* A. Rich); Rambutan (*Nephelium lappaceum* L.); Romã (*Punica granatum* L.); Sapota do Solimões (*Quaribea cordata* (Humb. & Bonpl.) Vish); Tâmara (*Phoenix dactylifera* L.); Tamarindo (*Tamarindus indica* L.); Taperebá (*Spondias lutea* L.); Umari (*Poraqueiba sericea* Tulasne).

<sup>1</sup> Trabalho apresentado no XIII Congresso Brasileiro de Fruticultura em Salvador, - BA, de 27.11 a 02.12.94.