Adaptación de gramíneas y leguminosas forrajeras en Bôa Vista, Brasil

Vicente Gianluppi
E. Adilson Serrão

ERA

EMBRAPA/PROPASTO/ CPATU El ensayo se estableció en Bôa Vista, territorio de Roraima, que posee una temperatura media anual de 26.5°C, una precipitación media anual de 1500 mm, y está situada a una altura de 100 msnm. La localidad corresponde al ecosistema de sabana bien drenada isohipertérmica.

Se están evaluando 4 ecotipos de gramíneas y 29 de leguminosas. La identificación de los ecotipos y los datos de las evaluaciones realizadas aparecen en el Cuadro 1.

Cuadro 1

RED DE ENSAYOS REGIONALES

PAIS=BRASIL

LOCALIDAD=BOAVISTA

ECOTIPO	EVALUACION			
	26/05/82			
	ADA.	COBE	ADA.	COBE
LEGUMINOSAS				
STYLOSANTHE GUIANENSIS	136	BUEN		
STYLOSANTHE GUIANENSIS	184	BUEN		
DESMODIUM OVALIFOLIUM	350	BUEN		
ZORNIA LATIFOLIA	728	BUEN		
STYLOSANTHE CAPITATA	1019	BUEN		
STYLOSANTHE CAPITATA	1097	BUEN		
STYLOSANTHE MACROCEPHA	1281	BUEN		
STYLOSANTHE CAPITATA	1315	BUEN		
STYLOSANTHE CAPITATA	1318	BUEN		
STYLOSANTHE CAPITATA	1342	BUEN		
STYLOSANTHE CAPITATA	1405	BUEN		
STYLOSANTHE CAPITATA	1441	BUEN		
STYLOSANTHE MACROCEPHA	1643	BUEN		
STYLOSANTHE CAPITATA	1693	BUEN		
STYLOSANTHE CAPITATA	1728	BUEN		
STYLOSANTHE CAPITATA	1943	BUEN		
STYLOSANTHE MACROCEPHA	2039	BUEN		
STYLOSANTHE CAPITATA	2044	BUEN		
STYLOSANTHE MACROCEPHA	2061	BUEN		
STYLOSANTHE MACROCEPHA	2093	BUEN		
DESMODIUM GYROIDES	3001	BUEN		
ZORNIA SP	7847	EXEL		
ZORNIA BRASILIENSIS	8025	BUEN		
ZORNIA LATIFOLIA	9179	BUEN		
ZORNIA SP	9286	BUEN		
PUERARIA PHASELOID	9900	REGU		