

ANÁLISE CONJUNTA DO ENSAIO BRASILEIRO DE CULTIVARES RECOMENDADOS DE AVEIA BRANCA, 2003

Floss, E. L.¹ Federizzi, L. C.² Matzembacker, R. G.³
Carvalho, F. I. F. de⁴ Almeida, M. L.⁵ Silva, A. C. da⁶
Almeida, J. L.⁷ Oliveira, J. C.⁸ Godoy, R.⁹ Oliveira, P.H.¹⁰
Gervini, P.¹¹ Molin, r.¹²

Este experimento, conduzido em rede, tem como objetivo avaliar o potencial de rendimento e outras características agrônômicas dos cultivares recomendados de aveia branca nas diferentes regiões fisiográficas do Centro-sul do Brasil. Os cultivares foram submetidos a dois tratamentos para controle de moléstias da parte aérea: com e sem a aplicação do fungicida tebuconazole (Folicur, 0,75L/ha), cujo número de aplicações variou de uma a três, dependendo do local. Na safra de 2003 foram avaliados 19 cultivares recomendados para toda a região. Foi conduzido em seis locais do RS (Passo Fundo, Vacaria, Eldorado do Sul, Cruz Alta, Pelotas e Três de maior), sete no PR (Ponta Grossa, Londrina, Mauá da Serra, Pato Branco, Entre Rios, Tibagi e Arapoti), um em SC (Lages), um SP (São Carlos), e um no Mato grosso do Sul (Dourados). Os cultivares foram avaliados quanto ao rendimento de grãos(RG),

¹ Universidade de Passo Fundo –UPF, Passo Fundo-RS;

² Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, Porto Alegre-RS;

³ Fundacep, cruz Alta-RS;

⁴ Universidade Federal de Pelotas-UFPEL, Pelotas-RS

⁵ UDESC, Lages-SC;

⁶ IAPAR, Ponta Grossa-PR;

⁷ FAPA, entre Rios-Guarapuava-PR;

⁸ IAPAR, Londrina-PR;

⁹ CPSE/EMBRAPA, São Carlos-SP;

¹⁰ CEFET/Pato Branco-PR;

¹¹ EMBRAPA, Dourados-MS;

¹² Fundação ABC, Carambei-PR.

peso do hectolitro (PH), peso de mil sementes (PMS), dias da emergência à floração (DEF), dias da emergência à maturação (DEM), estatura de plantas (EP), incidência de ferrugem da folha (%), severidade à ferrugem da folha (%), percentagem de grãos com largura maior que 2mm e percentagem de descasque (%). Os resultados obtidos são apresentados nas Tabelas de 1 a 26.

Tabela 1 – Rendimento de grãos desaristados (kg.ha^{-1}) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em diferentes locais do RS e SC, 2003

Cultivares	PF	VAC	ELS	PEL	CA	TRM	LAG
UPF 15	2372	4674	3399	3482	3371	1924	4218
UPF 16	1566	4568	3792	3309	3075	1958	4630
UPF 18	1432	4232	3643	3102	3496	1826	3600
UPF 19	1839	4178	3103	3040	3412	2590	3670
UPFA 20 (TEIXERINHA)	4049	3484	3595	3709	4888	3382	4139
UPFA 22 (TEMPRANA)	3262	4197	3129	3529	4141	3729	3435
UFRGS 14	2392	3876	2966	3078	3318	1681	3824
UFRGS 15	1692	4425	2190	2769	2130	806	4480
UFRGS 17	2361	4659	2710	3243	3026	1764	2853
UFRGS 19	2589	4352	2707	3216	3460	3340	3508
URS 20	4149	4055	4168	4124	4682	3903	3696
URS 21	4953	4177	3765	4298	4905	3931	4041
URS 22	2529	4004	2663	3065	3732	3292	3167
FAPA 4	3985	5219	4185	4463	4743	3479	4621
FAPA 5	4401	4337	3822	4187	4914	3542	4028
FAPA 6	4677	4594	3796	4356	4862	3174	3910
ALBASUL	1571	4178	2358	2702	2578	3313	4038
CFT 1	3309	4939	3215	3821	4660	2965	3744
CFT 2	2233	5260	3089	3527	4129	2382	4287
MEDIA	2914	4390	3279	3527	3870	2788	3889

PF = Passo Fundo; VAC = Vacaria; ELS = Eldorado do Sul; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta; TRM = Três de Maio; LAG = Lages.

Tabela 2 – Rendimento de grãos desaristados (kg.há⁻¹) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em diferentes locais do RS e SC, 2003

Cultivares	PF	VAC	ELS	PEL	CA	TRM	LAG
JPF 15	4283	4643	5462	4796	4368	3278	4067
JPF 16	4249	4486	4961	4565	5048	2938	4429
UPF 18	4812	4343	5573	4909	4927	2278	4231
UPF 19	4233	3818	5461	4504	4349	3951	3690
UPFA 20 (TEIXERINHA)	4963	3612	3992	4189	4939	4472	3902
UPFA 22 (TEMPRANA)	4718	4222	4847	4596	4680	4174	3394
UFRGS 14	4213	4339	5436	4663	4139	3264	3911
UFRGS 15	3899	4611	4546	4352	4073	2361	3692
UFRGS 17	4581	4843	5763	5062	4427	3569	4101
UFRGS 19	3715	4353	5147	4405	4518	4174	3408
URS 20	5054	4491	5223	4923	4713	4014	3951
URS 21	4991	4330	4290	4537	4783	4174	3866
URS 22	4472	4358	4714	4515	4425	4292	3656
FAPA 4	5369	5406	5411	5395	4993	3569	4059
FAPA 5	4353	4787	5139	4760	5053	3285	3376
FAPA 6	4849	4140	4204	4398	5283	3542	3350
ALBASUL	5273	3957	5655	4962	5055	4319	4142
CFT 1	5632	4994	5282	5303	4968	4042	3757
CFT 2	5136	5343	4798	5092	5616	3778	4068
MEDIA	4673	4478	5048	4733	4756	3656	3845

PF = Passo Fundo; VAC = Vacaria; ELS = Eldorado do Sul; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta; TRM = Três de Maio; LAG = Lages.

Tabela 3 – Rendimento de grãos desaristados (kg.ha⁻¹) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em outros locais, 2003

Cultivares	PG	GUA	LON	MAU	PB	CAS	ARA	TIB	DOU	SCA	Médias
URS 21	3507	5737	2654	4487	1681	6604	4729	5883	1462	2705	4089
FAPA 4	3426	5644	2695	4914	1534	5625	5750	4574	1826	2399	4064
UPFA 20	3819	5607	3727	5042	1896	5402	5632	4899	1398	2763	3966
FAPA 5	3424	5657	3173	4614	1067	5414	5513	4934	1657	1951	3920
URS 20	3538	5514	2556	4683	1637	4579	5668	5209	1690	2222	3887
CFT 1	3005	5228	3977	4118	1214	3946	5292	5561	1674	2513	3717
FAPA 6	3358	5135	2429	4178	1242	4621	3841	4087	1584	2535	3669
UPFA 22	3814	4917	2971	4552	1020	5925	4649	4414	1319	2054	3592
CFT 2	2635	5607	3380	3158	1680	3877	5734	4439	1317	2215	3468
ALBASUL	3313	5177	2982	3819	1913	6060	5019	3749	1227	2700	3335
UFRGS 19	3567	3770	2252	2762	1411	5901	4368	5583	1333	2449	3328
UPF 16	4409	4238	2359	2137	1228	5434	5378	4554	1421	2200	3309
UPF 18	4138	4992	2522	3793	1556	5312	4817	3979	1100	2671	3307
URS 22	3475	3908	2491	2639	1322	5448	4272	5455	1706	2452	3272
UPF 19	4044	3961	3186	2711	1930	5278	5358	3756	1443	1931	3261
UPF 15	4413	4625	2507	2996	1074	3839	4043	2934	1867	1480	3130
UFRGS 17	3738	4416	2742	3027	1500	4822	5075	3438	2511	1220	3124
UFRGS 14	3809	5108	2378	3344	1043	3708	4573	3010	1436	2242	3046
UFRGS 15	3745	4428	1846	2010	1371	2745	3230	1913	1870	761	2495
MEDIA	3641	4930	2780	3631	1438	4976	4892	4335	1571	2182	

PG = Ponta Grossa; GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; PB = Pato Branco; CAS = Castro; ARA = Arapoti; TIB = Tibagi; DOU = Dourados; SCA = São Carlos.

Tabela 4 – Rendimento de grãos desaristados (kg.há⁻¹) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em outros locais, 2003

Cultivares	PG	GUA	LON	MAU	PB	CAS	ARA	TIB	DOU	SAC	Médias
FAPA 4	4028	6049	2646	5278	1403	6621	6492	5344	1830	2177	4475
CFT 1	3453	5532	3915	4699	2043	5807	5930	6609	1746	2279	4470
CFT 2	3072	6054	3443	4809	2172	5654	6345	6688	1426	1624	4419
ALBASUL	3627	5782	3428	4610	1980	7765	6141	4598	1393	2232	4407
UFRGS 17	4177	3725	3080	5181	2118	5488	6640	5710	2613	2011	4299
URS 20	4148	5623	2417	4225	1608	6144	6232	6473	1774	1595	4271
UPF 16	4732	6129	2949	3648	1344	6989	6144	6058	1253	2491	4260
UPFA 20	4227	5585	4007	4506	1827	6961	6067	5095	1373	2684	4259
URS 21	4094	5335	3051	4539	2344	6629	5239	6578	1479	1596	4227
URS 22	4070	5456	3008	4482	1452	7553	4757	5857	1813	2345	4190
UPFA 22	4219	5564	2803	4084	1407	6822	5025	6359	1534	2386	4167
FAPA 5	4020	5455	3006	4659	1608	5940	6089	5339	1710	2215	4164
UFRGS 19	4162	5519	2550	4287	2017	6855	5129	6321	1513	2530	4153
UPF 19	4329	4104	2893	4401	1604	6517	5358	4656	1516	2374	3986
UPF 18	4720	4155	2591	3469	1555	6019	6110	4146	883	2951	3981
UPF 15	4996	4151	2644	5005	1504	5251	5122	3972	1887	2010	3967
FAPA 6	3717	4971	3867	4201	1902	5448	4620	5041	1422	2164	3948
UFRGS 14	4193	5575	2322	4503	1340	4916	5169	4735	1570	2169	3909
UFRGS 15	4180	4237	2248	4644	1881	5538	4018	4476	1858	1850	3674
MEDIA	4114	5211	2993	4486	1743	6259	5612	5477	1610	2194	

PG = Ponta Grossa; GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; PB = Pato Branco; CAS = Castro; ARA = Arapoti; TIB = Tibagi; DOU = Dourado; SCA = São Carlos.

Tabela 5 – Peso do hectolitro (kg.hl^{-1}) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em diferentes locais do RS e SC, 2003

Cultivares	PF	VAC	ELS	PEL	CA	TRM	LAG
UPF 15	41.1	54,4	48,0	51,2	48,5	37,5	54,6
UPF 16	43.4	58,1	50,6	54,4	43,9	35,3	55,6
UPF 18	37.1	54,1	46,6	50,4	45,1	35,1	56,1
UPF 19	42.5	55,1	49,9	52,5	50,1	38,0	57,6
UPFA 20 (TEIXERINHA)	52.0	55,8	50,9	52,9	52,3	37,9	55,6
UPFA 22 (TEMPRANA)	49.4	57,9	51,1	54,5	54,9	50,7	56,1
UFRGS 14	35.1	53,7	42,3	48,0	49,1	32,0	53,4
UFRGS 15	35.7	54,1	37,1	45,6	39,7	30,7	55,3
UFRGS 17	45.4	57,2	46,7	52,0	52,3	40,0	55,1
UFRGS 19	42.3	58,0	47,7	52,9	52,5	47,8	58,8
URS 20	46.4	55,9	55,4	55,7	52,5	49,0	55,4
URS 21	55.0	56,6	54,4	55,3	53,9	51,1	54,8
URS 22	45.0	57,2	49,3	50,5	49,1	45,4	57,3
FAPA 4	55.6	55,8	51,6	53,7	52,9	43,0	55,6
FAPA 5	54.6	55,6	52,1	53,9	47,2	43,4	54,5
FAPA 6	50.7	56,1	53,0	54,6	56,9	49,8	56,0
ALBASUL	39.5	48,9	37,9	43,4	39,0	39,2	53,1
CFT 1	41.5	57,0	48,0	52,5	51,7	40,6	57,5
CFT 2	40.7	57,2	45,0	51,1	50,1	38,5	57,4
Médias	50,7	55,7	48,3	51,8	49,6	41,3	55,8

PF = Passo Fundo; VAC = Vacaria; ELS = Eldorado do Sul; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta; TRM = Três de Maio; LAG = Lages.

Tabela 6 – Peso do hectolitro (kg.hl^{-1}) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em diferentes locais do RS e SC, 2003

Cultivares	PF	VAC	ELS	PEL	CA	TRM	LAG
UPF 15	54,3	55,7	52,1	53,9	50,6	38,9	54,5
UPF 16	55,0	57,9	52,7	55,2	54,2	42,1	55,0
UPF 18	55,9	53,8	51,9	52,9	53,6	36,1	54,8
UPF 19	56,5	55,0	54,2	54,6	56,5	41,9	57,6
UPFA 20 (TEIXERINHA)	51,7	54,7	52,9	53,8	52,8	43,3	57,7
UPFA 22 (TEMPRANA)	59,1	58,0	55,8	56,9	59,5	50,0	55,9
UFRGS 14	54,3	54,0	51,9	53,0	53,0	41,8	52,7
UFRGS 15	53,1	52,7	49,2	51,0	51,5	36,9	56,3
UFRGS 17	58,8	57,6	53,8	55,7	56,8	45,7	57,5
UFRGS 19	59,3	57,3	56,0	56,7	59,3	50,5	57,9
URS 20	57,7	57,3	58,0	57,7	53,5	48,1	62,0
URS 21	58,1	57,3	55,2	56,3	57,4	48,6	55,3
URS 22	59,5	58,8	57,7	58,3	61,7	52,2	58,5
FAPA 4	59,5	57,6	53,0	55,3	56,5	41,5	54,4
FAPA 5	55,2	55,1	53,0	54,1	43,0	41,6	54,7
FAPA 6	55,2	55,0	53,9	54,5	57,8	48,5	56,0
ALBASUL	52,7	47,9	50,1	49,0	52,7	42,4	52,9
CFT 1	57,5	55,8	50,0	52,9	59,1	43,6	57,9
CFT 2	57,5	56,0	55,5	55,8	55,6	42,7	56,6
Médias	55,0	55,7	53,5	54,6	55,0	44,0	56,2

PF = Passo Fundo; VAC = Vacaria; ELS = Eldorado do Sul; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta; TRM = Três de Maio; LAG = Lages.

Tabela 7 – Peso do hectolitro (kg.hl⁻¹) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em outros locais, 2003

Cultivares	PG	GUA	LON	MAU	PB	DOU	SCA	Médias
URS 20	45,0	59,6	49,0	50,3	31,7	58,0	57,3	51,9
UPFA 22 (TEMPRANA)	48,0	54,7	47,3	49,3	29,9	53,0	57,1	51,1
URS 21	39,0	53,7	45,7	47,3	29,7	57,0	56,9	50,7
FAPA 6	52,0	54,2	45,0	46,7	24,0	55,0	55,2	50,6
UFRGS 19	52,0	51,1	47,7	44,0	29,9	59,0	54,4	50,4
FAPA 4	49,0	53,7	45,7	45,7	31,6	59,0	54,3	50,1
CFT 1	45,0	55,5	48,3	47,3	30,1	57,0	55,8	49,7
URS 22	50,0	51,0	46,3	46,3	27,3	56,0	59,2	49,3
UFRGS 17	47,0	54,7	50,7	43,7	36,7	60,0	43,7	49,2
UPF 19	51,0	52,7	48,3	42,7	32,7	56,0	50,5	49,0
UPFA 20 (TEIXERINHA)	47,0	53,5	44,7	45,0	32,4	51,0	53,8	48,9
FAPA 5	44,0	53,7	43,0	46,3	31,6	56,0	50,2	48,6
CFT 2	39,0	54,7	45,7	44,7	33,6	53,0	55,4	48,1
UPF 16	46,0	50,4	42,3	39,3	32,3	57,0	50,0	47,3
UPF 15	47,0	52,9	45,3	41,3	26,9	56,0	44,6	46,8
UFRGS 14	47,0	53,2	45,3	41,3	27,2	54,0	50,9	46,0
UPF 18	47,0	54,3	45,3	43,3	27,5	36,0	53,2	45,7
ALBASUL	45,0	48,4	43,3	40,3	33,6	58,0	54,5	45,0
UFRGS 15	52,0	50,5	43,7	36,0	30,5	52,0	41,0	43,7
Médias	46,9	53,3	45,9	44,3	30,5	54,9	52,5	

PG = Ponta Grossa; GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; PB = Pato Branco; DOU = Dourado; SCA = São Carlos.

Tabela 8 – Peso do hectolitro (kg.hl⁻¹) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em outros locais, 2003

Cultivares	PG	GUA	LON	MAU	PB	CAS	ARA	TIB	DOU	SCA	Médias
URS 20	48,0	59,3	50,3	47,0	40,1	48,3	47,3	51,7	58,0	47,8	52,2
URS 22	42,0	56,4	47,3	49,7	37,5	43,7	45,7	47,3	58,0	53,9	51,8
UFRGS 17	51,0	57,0	50,0	46,7	40,3	44,7	45,3	44,7	60,0	55,8	51,4
UPFA 22	47,0	54,9	46,3	51,0	37,3	46,7	44,0	46,0	52,0	50,6	50,7
UFRGS 19	47,0	56,7	48,0	47,3	38,0	43,7	45,7	46,3	59,0	41,5	50,7
UPF 19	49,0	56,9	47,7	46,0	41,3	47,0	45,3	42,7	56,0	54,8	50,4
URS 21	50,0	53,6	44,0	46,0	42,4	44,7	43,7	47,7	56,0	47,9	50,4
CFT 1	52,0	56,2	49,0	47,7	38,3	43,0	43,3	45,3	57,0	50,1	50,1
UPF 16	48,0	55,7	43,7	43,7	40,0	44,0	43,3	44,3	57,0	54,7	49,8
FAPA 6	52,0	53,6	46,3	48,7	37,2	40,7	41,7	39,3	56,0	52,7	49,6
CFT 2	50,0	55,5	46,7	47,3	36,5	45,3	43,7	45,7	54,0	45,5	49,5
UPFA 20	50,0	53,6	45,0	44,0	39,5	45,7	41,3	42,0	51,0	52,9	48,8
FAPA 4	49,0	52,8	44,0	44,7	37,7	39,7	40,3	40,3	59,0	50,2	48,5
UFRGS 14	48,0	54,9	43,7	44,7	37,3	42,3	43,0	39,3	56,0	56,0	48,2
UPF 15	48,0	56,5	45,7	42,3	37,1	38,7	45,0	39,7	56,0	55,4	48,1
UFRGS 15	48,0	57,9	43,0	45,3	39,5	42,3	41,7	37,7	54,0	55,5	47,6
FAPA 5	49,0	52,1	43,0	45,0	35,9	39,7	41,0	40,7	56,0	53,7	47,3
ALBASUL	43,0	50,5	43,0	43,7	40,4	37,7	43,0	38,0	57,0	53,8	46,6
UPF 18	49,0	54,0	45,0	43,7	39,5	37,3	42,7	35,7	39,0	53,7	46,4
Médias	48,4	55,2	45,9	46,0	38,7	42,9	43,5	42,9	55,3	51,9	

PG = Ponta Grossa; GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; PB = Pato Branco; CAS = Castro; ARA = Arapoti; TIB = Tibagi; DOU = Dourado; SCA = São Carlos.

Tabela 9 – Peso de mil sementes (g) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em diferentes locais do RS e SC, 2003

Cultivares	PF	VAC	ELS	PEL	CA	TRM	LAG
UPF 15	40,7	38,2	33,8	37,6	26,5	24,0	36,6
UPF 16	40,5	35,4	31,8	35,9	22,0	24,4	31,0
UPF 18	39,0	31,8	29,3	33,4	24,7	23,8	31,2
UPF 19	41,9	33,8	31,8	35,8	26,6	26,6	34,7
UPFA 20 (TEIXERINHA)	41,3	40,3	37,3	39,6	33,5	32,6	37,0
UPFA 22 (TEMPRANA)	41,2	36,6	32,0	36,6	31,5	34,1	34,2
UFRGS 14	44,0	39,8	34,0	39,3	31,1	26,1	38,7
UFRGS 15	40,3	37,6	27,0	35,0	23,5	19,9	33,1
UFRGS 17	41,9	34,0	27,5	34,5	27,6	24,8	35,0
UFRGS 19	39,4	29,4	26,3	31,7	24,3	26,2	29,6
URS 20	42,0	32,8	30,2	35,0	29,0	30,6	34,3
URS 21	40,3	31,3	31,7	34,4	29,7	31,1	28,5
URS 22	40,8	29,5	25,5	31,9	27,2	26,2	29,8
FAPA 4	38,2	28,2	27,2	31,2	22,3	22,4	26,4
FAPA 5	44,7	35,8	35,2	38,6	35,2	33,9	37,0
FAPA 6	42,0	32,5	31,3	35,3	30,3	34,2	32,5
ALBASUL	35,1	24,8	27,8	29,2	23,2	24,8	24,6
CFT 1	41,2	33,1	30,2	34,8	25,2	26,3	32,8
CFT 2	40,1	33,2	26,3	33,2	24,8	22,9	31,2
Médias	40,8	33,6	30,3	34,9	27,3	27,1	32,5

PF = Passo Fundo; VAC = Vacaria; ELS = Eldorado do Sul; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta; TRM = Três de Maio; LAG = Lages.

Tabela 10 – Peso de mil sementes (g) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em diferentes locais do RS e SC, 2003

Cultivares	PF	VAC	ELS	PEL	CA	TRM	LAG
UPF 15	26,1	38,6	40,3	35,0	30,0	26,9	37,6
UPF 16	22,3	35,5	37,3	31,7	31,1	28,7	32,6
UPF 18	22,2	32,3	33,7	29,4	29,6	24,3	30,6
UPF 19	26,3	34,4	38,0	32,9	31,7	30,2	33,1
UPFA 20 (TEIXERINHA)	34,9	40,1	40,7	38,6	36,0	35,3	37,2
UPFA 22 (TEMPRANA)	30,1	36,8	35,7	34,2	31,2	34,2	33,0
UFRGS 14	30,6	38,0	41,5	36,7	32,7	32,8	37,7
UFRGS 15	23,6	35,1	35,7	31,5	28,3	26,4	33,8
UFRGS 17	29,0	36,4	38,7	34,7	34,0	31,7	35,9
UFRGS 19	22,8	29,5	31,8	28,0	29,1	30,2	31,1
URS 20	30,0	33,3	35,7	33,0	29,7	32,0	33,6
URS 21	28,3	31,7	34,2	31,4	30,1	32,0	28,8
URS 22	23,8	31,1	29,7	28,2	31,5	31,2	29,3
FAPA 4	22,8	28,4	30,0	27,1	23,4	22,7	27,5
FAPA 5	34,5	38,4	35,2	36,0	33,7	32,6	35,6
FAPA 6	30,5	38,5	34,5	34,5	32,3	34,6	32,4
ALBASUL	21,9	27,9	29,3	26,4	25,4	25,7	25,9
CFT 1	25,2	32,2	33,3	30,2	30,1	27,2	31,8
CFT 2	23,5	32,6	35,7	30,6	29,7	26,9	30,9
Médias	26,8	34,3	35,3	32,1	30,5	29,8	32,5

PF = Passo Fundo; VAC = Vacaria; ELS = Eldorado do Sul; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta; TRM = Três de Maio; LAG = Lages.

Tabela 11 – Peso de mil sementes (g) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em outros locais, 2003

Cultivares	GUA	LON	MAU	PB	DOU	SCA	Médias
UPFA 20 (TEIXERINHA)	44,3	40,8	37,5	25,2	29,9	37,9	36,7
UFRGS 14	39,9	34,7	36,6	21,2	35,7	38,3	35,3
FAPA 5	41,7	28,1	35,6	21,5	32,7	33,8	34,9
UPFA 22 (TEMPRANA)	38,0	35,0	37,2	22,8	31,1	35,6	34,3
FAPA 6	40,6	31,8	34,6	21,0	30,5	34,7	33,2
UPF 15	38,3	32,8	29,9	19,7	33,8	34,1	32,8
URS 20	40,7	32,4	34,5	20,7	29,6	34,8	32,8
UPF 19	37,1	34,9	31,7	21,5	32,1	36,7	32,7
UFRGS 17	39,6	35,2	33,9	22,2	35,7	33,3	32,7
CFT 1	35,4	34,6	32,6	20,8	29,1	32,7	31,5
URS 21	33,4	31,4	31,5	20,7	28,4	31,7	31,1
UPF 16	36,0	32,1	26,7	22,8	32,3	31,0	30,9
UFRGS 15	37,1	28,4	24,7	22,8	31,3	32,0	30,2
CFT 2	35,8	31,7	28,8	18,7	28,2	32,0	29,8
UPF 18	36,7	29,4	31,3	19,0	21,4	31,5	29,4
URS 22	31,0	31,8	30,3	19,2	26,5	32,5	29,4
UFRGS 19	32,2	28,7	26,2	20,2	27,0	32,2	28,7
FAPA 4	34,2	28,7	28,9	23,0	27,0	25,8	28,0
ALBASUL	33,5	31,4	27,6	24,2	28,7	26,8	27,8
Médias	37,1	32,3	31,6	21,4	30,1	33,0	

GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; PB = Pato Branco; DOU = Dourado; SCA = São Carlos.

Tabela 12 – Peso de mil sementes (g) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em outros locais, 2003

Cultivares	GUA	LON	MAU	PB	DOU	SCA	Médias
CFT 2	36,1	33,7	31,4	26,5	30,1	33,7	30,9
FAPA 4	34,9	25,3	28,4	27,3	27,0	35,7	27,7
UFRGS 19	34,7	30,5	30,7	26,2	27,9	31,2	29,5
URS 22	34,3	29,8	33,0	28,2	28,1	37,6	30,4
ALBASUL	31,3	30,1	27,2	26,2	27,3	31,1	27,4
UPF 18	37,4	32,3	32,1	25,8	23,1	27,4	29,3
UPFA 20 (TEIXERINHA)	43,7	38,5	37,5	29,5	30,5	36,1	36,8
UFRGS 14	43,2	35,3	37,6	23,5	36,5	32,1	35,2
UFRGS 17	41,4	36,6	38,0	25,7	36,2	35,6	34,9
FAPA 5	41,6	32,7	34,5	27,7	32,9	38,8	34,9
FAPA 6	41,2	34,4	36,2	28,7	29,1	36,6	34,1
URS 20	39,7	42,9	34,9	27,5	30,3	32,8	33,5
UPF 15	41,2	32,5	33,8	25,8	33,6	31,8	33,3
UPF 19	39,4	34,4	35,6	26,0	31,8	33,2	32,8
UPF 16	39,3	33,5	33,3	28,3	32,3	34,0	32,3
UFRGS 15	42,3	30,2	29,8	26,7	32,3	32,3	31,4
UPFA 22 (TEMPRANA)	37,8	36,2	38,4	25,2	31,1	25,2	33,0
URS 21	33,3	31,2	31,1	28,0	28,7	34,1	31,0
CFT 1	36,4	32,5	32,5	27,0	30,7	33,5	31,0
Médias	38,4	33,3	33,5	26,8	30,5	33,3	

GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; PB = Pato Branco; DOU = Dourado; SCA = São Carlos.

Tabela 13 – Dias da emergência a floração do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em diferentes locais, 2003

Cultivares	PF	PEL	CAL	GUA	LON	MAU	PB	CAS	ARA	TIB	SCA	Médias
UPFA 22	97	87	89	134	73	73	63	63	69	79	56	79
URS 22	97	86	90	133	73	78	63	63	70	80	61	80
UFRGS 19	97	90	93	133	80	86	70	70	81	81	66	85
URS 21	97	90	92	138	75	76	77	77	77	81	65	85
UPFA 20	104	98	94	144	80	83	72	72	81	86	63	87
URS 20	97	99	94	145	79	76	79	79	75	78	63	87
FAPA 6	97	95	96	142	82	76	83	83	78	85	65	89
FAPA 4	104	98	95	141	90	78	80	80	82	85	69	90
FAPA 5	104	96	98	144	80	90	83	83	82	86	66	91
CFT 1	104	96	98	142	77	93	82	82	82	88	69	91
CFT 2	104	96	101	135	77	93	82	82	84	85	75	91
ALBASUL	104	98	98	141	87	93	83	83	84	96	69	93
UPF 19	109	98	102	142	85	89	83	83	88	93	75	94
UPF 16	107	97	100	140	89	92	84	84	89	97	74	95
UFRGS 17	111	103	102	142	90	100	83	83	89	88	86	97
UPF 18	109	107	107	145	87	92	91	91	92	95	79	99
UFRGS 14	111	102	108	140	92	92	98	98	93	98	84	100
UPF 15	111	103	108	143	94	98	92	92	101	99	84	101
UFRGS 15	116	109	110	142	98	106	98	98	110	103	97	107
Médias	98	97	99	140	84	88	81	81	85	89	72	

PF = Passo Fundo; PEL = Pelotas; CAL = Cruz Alta; GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; PB = Pato Branco; CAS = Castro; ARA = Arapoti; TIB = Tibagi; SCA = São Carlos.

Tabela 14 – Dias da emergência a floração do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em diferentes locais do RS, 2003

Cultivares	PF	ELS	PEL	CA
UPF 15	108	101	103	108
UPF 16	107	98	97	100
UPF 18	106	100	107	107
UPF 19	108	97	98	102
UPFA 20 (TEIXERINHA)	102	89	98	98
UPFA 22 (TEMPRANA)	100	85	87	89
UFRGS 14	110	101	102	108
UFRGS 15	116	107	109	110
UFRGS 17	107	101	103	102
UFRGS 19	99	85	89	93
URS 20	102	91	99	94
URS 21	97	87	89	92
URS 22	97	83	86	90
FAPA 4	105	91	98	95
FAPA 5	104	93	97	98
FAPA 6	101	91	95	96
ALBASUL	104	92	98	98
CFT 1	104	97	96	98
CFT 2	105	99	96	101
Médias	104	94	97	99

PF = Passo Fundo; ELS = Eldorado do Sul; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta.

Tabela 15 – Dias da emergência a floração do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em outros locais locais, 2003

Cultivares	GUA	LON	MAU	CAS	ARA	TIB	DOU	SCA	Médias
UPFA 22 (TEMPRANA)	80	73	75	63	68	78	65	56	77
URS 22	81	77	78	63	70	77	68	61	78
URS 21	92	75	76	77	76	83	72	65	82
UFRGS 19	88	80	86	70	81	82	78	66	83
URS 20	91	79	78	80	75	80	69	63	83
UPFA 20 (TEIXERINHA)	87	80	85	72	81	88	74	63	85
FAPA 6	94	82	80	83	78	82	72	65	85
FAPA 4	91	90	82	80	83	87	73	69	87
FAPA 5	91	80	90	83	83	85	76	66	87
CFT 1	92	77	93	82	84	85	75	69	88
ALBASUL	96	87	93	83	84	92	77	69	89
CFT 2	92	77	96	82	84	87	77	75	89
UPF 19	95	85	91	83	88	93	81	75	91
UPF 16	93	89	96	84	89	95	85	74	92
UFRGS 17	96	93	103	83	90	90	87	86	95
UPF 18	95	87	92	114	93	96	80	79	96
UFRGS 14	95	92	94	98	93	98	80	84	96
UPF 15	97	94	100	92	101	99	89	84	98
UFRGS 15	101	100	106	98	110	103	96	97	104
Médias	92	84	89	83	85	88	78	72	

GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; CAS = Castro; ARA = Arapoti; TIB = Tibagi; DOU = Dourado; SCA = São Carlos.

Tabela 16 – Dias da emergência a maturação do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em diferentes locais, 2003

Cultivares	PF	PEL	CA	GUA	LON	MAU	CAS	ARA	TIB	SCA	Médias
URS 22	144	139	132	133	103	115	133	139	133	103	127
UPFA 22	144	139	132	134	105	115	147	140	145	103	130
URS 21	144	139	132	138	104	115	147	140	139	103	130
CFT 2	144	139	138	135	108	120	133	140	128	110	130
UFRGS 19	144	139	132	133	112	120	147	142	133	112	131
CFT 1	150	139	138	142	108	120	133	142	133	107	131
URS 20	151	139	138	145	110	118	147	139	128	107	132
FAPA 6	144	139	137	142	110	120	147	138	144	103	132
ALBASUL	144	139	137	141	112	125	147	139	146	110	134
UPFA 20	151	139	138	144	112	120	147	142	145	112	135
UFRGS 14	144	139	143	140	120	123	147	135	145	112	135
FAPA 4	150	139	138	141	118	123	147	142	145	107	135
FAPA 5	150	139	138	144	108	125	147	144	145	107	135
UPF 16	151	139	138	140	120	128	147	144	144	112	136
UPF 18	151	139	137	145	118	128	147	144	145	110	136
UPF 19	151	139	138	142	115	123	147	146	145	112	136
UPF 15	152	139	139	143	124	132	147	143	145	120	138
UFRGS 17	150	139	143	142	122	128	147	143	145	120	138
UFRGS 15	150	139	143	142	128	138	147	151	145	122	141
Médias	148	139	137	140	114	123	145	142	141	110	

PF = Passo Fundo; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta; GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; CAS = Castro; ARA = Arapoti; TIB = Tibagi; SCA = São Carlos.

Tabela 17 – Dias da emergência a maturação do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em diferentes locais, 2003

Cultivares	PF	PEL	CA	GUA	LON	MAU	CAS	ARA	TIB	DOU	SCA	Médias
UPFA 22	160	139	138	137	106	115	149	143	137	125	103	132
URS 21	152	139	138	141	106	115	149	140	136	136	103	132
URS 22	153	139	144	136	105	118	149	140	140	136	103	133
FAPA 6	151	139	138	143	110	120	149	141	145	136	103	134
CFT 2	154	139	145	137	108	120	149	144	133	136	110	134
URS 20	153	139	144	145	110	120	152	141	137	136	107	135
CFT 1	159	139	144	145	108	120	149	144	136	136	107	135
UPFA 20	152	139	143	145	113	120	149	146	145	136	112	136
UFRGS 19	159	139	145	138	112	120	149	148	133	136	112	136
FAPA 4	152	139	143	143	118	123	149	143	145	136	107	136
FAPA 5	154	139	143	145	108	125	149	144	145	136	107	136
ALBASUL	152	139	143	146	112	125	149	141	145	136	110	136
UPF 18	154	139	139	147	118	128	149	149	145	136	110	138
UPF 19	159	139	139	151	115	125	149	151	145	136	112	138
UFRGS 14	158	139	145	143	122	123	149	142	145	136	112	138
UPF 16	159	139	143	146	120	128	149	152	147	143	112	140
UFRGS 17	156	143	144	148	122	130	152	151	133	143	120	140
UPF 15	156	139	143	151	124	136	149	152	145	143	120	142
UFRGS 15	164	150	145	152	128	138	152	148	145	143	122	144
Médias	156	140	142	144	114	124	149	145	141	137	110	

PF = Passo Fundo; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta; GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; CAS = Castro; ARA = Arapoti; TIB = Tibagi; DOU = Dourado; SCA = São Carlos.

Tabela 18 – Estatura de plantas (cm) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em diferentes locais, 2003

Cultivares	PF	VAC	PEL	CA	TRM	LAG	PG	GUA	LON	MAU	SCA	Médias
URS 22	83	78	108	110	80	92	114	91	79	76	86	93
ALBASUL	84	84	107	115	78	86	113	93	80	80	82	93
UFRGS 19	87	90	113	110	85	85	107	96	86	80	88	94
UFRGS 15	92	85	102	120	80	95	129	105	76	81	101	99
FAPA 4	95	95	123	120	90	85	119	93	84	87	87	99
UFRGS 14	96	82	115	125	96	96	123	102	77	86	97	102
UPF 16	98	95	117	130	97	95	115	106	90	94	99	105
UPFA 20	95	90	122	125	93	94	120	110	91	93	99	105
UPFA 22	100	103	120	140	94	92	123	111	98	98	94	108
URS 20	95	105	123	125	96	102	127	116	90	97	96	108
FAPA 6	107	103	125	130	90	114	95	118	96	106	102	108
UFRGS 17	95	95	128	125	103	96	121	114	87	91	111	109
CFT 1	105	98	127	135	84	103	116	114	93	100	104	109
URS 21	104	100	133	130	100	100	95	118	102	107	104	110
FAPA 5	105	102	127	135	113	91	100	121	106	106	104	111
UPF 19	105	102	130	140	110	96	107	123	102	100	103	112
CFT 2	110	102	130	145	90	99	107	124	102	108	109	113
UPF 15	100	110	122	145	100	122	112	126	96	101	112	115
UPF 18	115	110	145	150	120	111	104	127	101	106	113	120
Médias	98	96	122	129	95	98	113	111	91	95	100	

PF= Passo Fundo; VAC = Vacaria; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta; TRM = Três de Maio; LAG = Lages; PG = Ponta Grossa; GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; SCA = São Carlos.

Tabela 19 – Estatura de plantas (cm) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em diferentes locais do RS e SC, 2003

Cultivares	PF	VAC	ELS	PEL	CA	TRM	LAG
UPF 15	110	108	120	120	145	110	100
UPF 16	98	98	98	115	130	100	92
UPF 18	123	118	120	142	155	120	123
UPF 19	107	106	115	122	145	115	108
UPFA 20 (TEIXERINHA)	100	94	95	113	125	95	95
UPFA 22 (TEMPRANA)	104	103	115	118	140	95	104
UFRGS 14	94	92	105	112	125	113	94
UFRGS 15	93	91	83	107	120	90	91
UFRGS 17	101	102	117	122	135	114	106
UFRGS 19	90	88	90	113	115	94	86
URS 20	100	98	113	115	125	96	94
URS 21	109	102	108	132	135	105	103
URS 22	87	79	82	103	110	87	83
FAPA 4	97	92	97	123	120	95	87
FAPA 5	105	105	112	123	140	115	104
FAPA 6	107	105	109	120	135	98	101
ALBASUL	88	90	95	103	115	84	84
CFT 1	105	102	115	123	140	92	101
CFT 2	115	108	126	132	145	94	109
Médias	102	99	106	119	132	101	98

PF = Passo Fundo; VAC = Vacaria; ELS = Eldorado do Sul; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta; TRM = Três de Maio; LAG = Lages.

Tabela 20 – Estatura de plantas (cm) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em outros locais, 2003

Cultivares	PG	LON	MAU	CAS	ARA	TIB	DOU	SCA	Médias
URS 22	95	84	93	119	103	111	59	86	92
ALBASUL	118	83	84	110	111	106	56	82	94
UFRGS 19	126	93	83	113	118	111	56	90	98
UFRGS 15	136	78	98	104	121	114	60	104	99
FAPA 4	123	84	85	113	116	107	58	92	99
UPFA 20 (TEIXERINHA)	119	97	92	119	119	119	65	102	103
UFRGS 14	119	79	100	111	119	111	66	102	103
URS 20	108	91	102	129	122	123	70	98	106
UPF 16	136	96	97	121	124	126	75	103	107
UPFA 22 (TEMPRANA)	112	97	101	131	123	127	67	93	109
CFT 1	95	102	102	127	127	123	69	104	109
FAPA 6	122	96	105	132	129	127	72	104	111
UFRGS 17	119	90	98	131	134	128	72	113	112
URS 21	120	105	103	136	130	132	76	104	113
UPF 15	114	100	104	118	131	134	79	112	114
UPF 19	129	103	102	130	135	135	75	104	115
FAPA 5	122	107	112	133	131	129	81	108	115
CFT 2	119	107	109	130	141	131	70	111	116
UPF 18	106	104	103	130	141	138	76	112	121
Médias	118	94	99	123	125	123	69	101	

PG = Ponta Grossa; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; CAS = Castro; ARA = Arapoti; TIB = Tibagi; DOU = Dourado; SCA = São Carlos.

Tabela 21 – Incidência de ferrugem da folha (%) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em diferentes locais do RS, 2003

Cultivares	PF	ELS	PEL	CA	Médias
URS 21	4	0	15	0	5
FAPA 6	4	0	15	0	5
FAPA 5	2	1	15	5	6
UPFA 20 (TEIXERINHA)	4	10	13	5	8
FAPA 4	2	5	23	10	10
URS 20	3	1	33	5	11
UPF 15	9	10	60	40	30
UPF 19	7	30	53	40	33
UPFA 22 (TEMPRANA)	3	30	73	30	34
CFT 1	4	50	53	30	34
UPF 18	8	40	60	30	35
UFRGS 17	1	40	87	30	39
UFRGS 15	8	30	87	40	41
UFRGS 14	8	50	100	20	45
UPF 16	12	40	77	60	47
CFT 2	8	50	100	50	52
UFRGS 19	3	80	80	80	61
ALBASUL	12	60	100	80	63
URS 22	6	80	100	70	64
Médias	6	32	60	33	

PF = Passo Fundo; ELS = Eldorado do Sul; PEL = Pelotas; CA = Cruz Alta.

Tabela 22 – Severidade de ferrugem da folha (%) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em diferentes locais, 2003

Cultivares	PF	TRM	LAG	PG	GUA	LON	MAU	PB	CAS	ARA	TIB	Médias
URS 21	5	0	0	1	0	1	1	5	0	0	0	1
UPF 18	0	6	0	1	3	1	0	15	5	0	5	3
UPFA 22	2	3	0	1	1	1	1	15	10	0	15	5
UPFA 20	3	2	0	2	1	1	1	10	45	0	1	6
FAPA 5	1	1	0	15	20	1	1	7	10	0	25	7
FAPA 6	2	1	0	5	2	1	1	5	45	0	25	8
FAPA 4	2	1	0	2	8	2	10	20	40	0	25	10
URS 20	5	7	0	5	15	1	10	5	90	15	80	21
CFT 1	3	5	0	5	32	3	5	10	90	15	80	23
URS 22	2	16	1	2	100	5	65	10	20	30	10	24
UPF 15	2	3	1	5	40	1	83	20	55	7	55	25
ALBASUL	3	4	1	5	100	30	43	7	45	10	30	25
UFRGS 19	3	9	1	10	100	13	83	10	45	5	25	28
UPF 19	0	8	1	35	90	5	73	5	55	15	35	29
UPF 16	2	12	1	3	98	23	92	15	25	15	40	30
UFRGS 14	0	13	1	30	55	5	43	8	85	10	80	30
CFT 2	0	4	1	20	63	2	20	20	90	15	90	30
UFRGS 17	6	13	0	30	70	5	80	10	80	0	60	32
UFRGS 15	2	23	1	2	70	13	60	8	85	15	85	33
Médias	2	7	1	9	46	6	35	11	48	8	40	

PF = Passo Fundo; TRM = Três de Maio; LAG = Lages; PG = Ponta Grossa; GUA = Guarapuava; LON = Londrina; MAU = Mauá da Serra; PB = Pato Branco; CAS = Castro; ARA = Arapoti; TIB = Tibagi.

Tabela 23 – Percentagem de grãos com largura maior 2mm (%) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em diferentes locais, 2003

Cultivares	PF	VAC	PB	ELD	PEL	Médias
URS 20	84,6	87,8	79,2	80,6	79	82,2
UPFA 20	83,5	90,1	63,8	83	82,6	80,6
FAPA 6	81,3	86,1	72,2	77,2	82,6	79,9
FAPA 5	86,1	86,6	56,4	82,8	80,6	78,5
UFRGS 14	77,6	89,3	64,6	80,4	77,8	77,9
UPF 16	69,1	87,7	63,4	79	79,4	75,7
URS 21	77,8	88,1	58,6	75,6	75,8	75,2
UFRGS 17	72	88,9	70,6	72,4	71,8	75,1
UFRGS 15	73,6	87,8	51,4	71	75,4	71,8
UPF 18	66	87	62,4	69	69,8	70,8
CFT 2	51,2	85,1	63,6	68,6	69,4	67,6
URS 22	66,3	77,5	66	63,8	64	67,5
UPF 15	77,2	87,3	56,4	84,6	74,8	76,0
UPF 19	70,2	83,9	52,2	77	76,6	72,0
UPFA 22	79,6	85,5	56	78,4	80,4	76,0
UFRGS 19	53	86,7	46,2	63,4	60,6	62,0
FAPA 4	34,4	83,7	61,2	54,4	56,4	58,0
ALBASUL	74,4	83,8	62,2	84,4	75,4	76,0
CFT 1	56,8	89,2	58,8	74	86,2	73,0
Médias	70,2	86,5	61,3	74,7	74,7	73,5

Tabela 24 – Percentagem de descasque (%) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, sem fungicida em diferentes locais, 2003

Cultivares	PF	VAC	PB	ELD	PEL	Médias
FAPA 4	73,3	77,7	64,906	78,464	75,2	73,9
UPF 16	65,6	74,8	68,847	80,653	78,0	73,6
URS 21	73,6	72,9	58,821	81,542	77,7	72,9
UFRGS 17	71,6	74,9	66,8	75,016	72,4	72,1
FAPA 5	58,3	74,9	62,379	82,03	81,3	71,8
UPF 15	65	78,1	60,148	82,534	70,4	71,2
UPFA 20	70,3	73,4	57,25	76,194	78,8	71,2
UPFA 22	72,3	72,6	62,723	73,571	71,7	70,6
URS 22	65,3	74,2	64,968	72,46	74,3	70,2
UFRGS 19	68,3	74,9	60,306	75,173	70,3	69,8
FAPA 6	72	75,3	51,856	74,366	75,5	69,8
UPF 19	68,3	73,5	55,331	76,394	73,0	69,3
CFT 1	67	74,5	57,411	70,547	75,9	69,1
ALBASUL	57,3	73	53,233	76,602	77,9	67,6
UFRGS 15	62,3	73,3	66,844	67,761	67,2	67,5
CFT 2	56,6	75,7	64,771	71,032	67,6	67,1
UFRGS 14	50,3	73,4	66,807	70,757	67,2	65,7
UPF 18	55	75,1	62,983	66,354	60,1	63,9
URS 20	75,6	74,2	62,339	84,012	83,8	76,0
Médias	65,7	74,5	61,5	75,5	73,6	70,2

Tabela 25 – Percentagem de grãos com largura maior 2mm (%) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em diferentes locais, 2003

Cultivares	PF	VAC	ARA	TIB	PB	CAS	ELD	GUA	PEL	Méd.
UPFA 20	88,8	90,7	94,6	94,8	71,4	95,6	88,2	91,4	84,8	88,9
UFRGS 14	88,8	90,9	94,2	94	69,2	94	89,8	91,4	87,4	88,9
UPFA 22	85,7	90,3	93,2	93,8	72,2	95,6	87,6	92,2	86,6	88,6
FAPA 6	87,3	88,9	93,8	94,6	73,2	95,2	87,2	89,8	83,4	88,2
UPF 15	86,9	89,7	97,4	91	60,4	90,4	86,4	91,4	85,4	86,6
URS 22	84,8	83,3	95	95,4	59,4	96,2	87,2	94	83,2	86,5
UPF 19	84,2	88	92,6	94,2	66,6	88	83,8	89,8	84	85,7
FAPA 5	87,8	87,9	92,6	91,8	60,8	96	84	91	79,6	85,7
CFT 1	89,5	89,3	85,4	95,8	65,8	93,4	88,6	93,4	70,4	85,7
URS 20	85,2	85,6	95	95	64,2	92	82,6	89,4	81,4	85,6
CFT 2	81,8	80,3	86,8	90,2	60,2	90,4	90,4	94	87,4	84,6
UPF 16	83,6	89,1	88,4	84,6	64,2	94,4	83,2	89,4	83,8	84,5
UFRGS 15	85	87,3	96,4	91,2	55,8	90	84,2	84,4	83,4	84,2
UFRGS 17	81,8	80,5	97,2	89	50,2	93	81,8	90,4	77	82,3
URS 21	75,4	87,9	86,4	88	55,6	92,6	85,4	82,8	82	81,8
UPF 18	73,4	87,6	89,8	91,4	49,6	92,6	74,6	83	80	80,2
FAPA 4	60,5	85,7	87	91,8	51	85,8	67,6	70,4	62,2	73,6
UFRGS 19	82,2	88,6	93,4	94,8	58,8	94,8	83	88,4	80,6	85
ALBASUL	72,4	85,3	90	87	69,6	91,4	80,6	86	75,4	82
Médias	82,4	87,2	92,1	92,0	62,0	92,7	84,0	88,5	80,9	84,7

Tabela 26 – Percentagem de descasque (%) do ensaio de cultivares recomendados de aveia branca, com fungicida em diferentes locais, 2003

Cultivares	PF	VAC	ARA	TIB	PB	CAS	ELD	GUA	PEL	Méd.
URS 20	74	75	79,1	78,9	72,7	72,9	81,7	80,6	84,3	77,7
FAPA 5	76,6	77	77,2	73,4	67,4	73	80,8	79,5	82,3	76,3
UPF 16	76	75	75,5	73,3	71,6	71,1	76,3	76,5	81,3	75,2
FAPA 4	75,6	74	74,4	74	69,5	72,1	76	75,8	78,4	74,5
UFRGS 17	76	74	77,2	68,3	65,2	71,5	76,1	79,5	79,4	74,2
ALBASUL	71,6	77	80,6	72,1	66,4	69,8	74,5	73,9	77,5	73,7
UPF 19	72,3	74	76,1	70,6	67,3	71,3	75,5	76,6	76,5	73,4
UFRGS 19	72,6	73	73,4	73,5	64,4	72,2	75,5	76,7	79,8	73,4
URS 22	71	70	75,6	74,9	64,7	72,4	75	75,9	80	73,3
UPF 15	67,6	76	70,1	64,9	65,9	73	76,4	80,2	80,8	72,8
CFT 1	72	74	72,4	72,5	69,1	70,1	75,3	75	71,9	72,4
UFRGS 15	70,6	75	75	67,9	68,7	67,7	72,8	78,2	75,3	72,3
CFT 2	72,6	73	70,3	71,6	71,3	69,7	72	73,5	76,6	72,3
UPFA 20	67,6	76	71,7	72,3	65,1	65,8	75,5	75,5	79,1	72,1
FAPA 6	70,6	75	66,9	72,1	65,5	69,6	75,5	74,7	77,5	71,9
UPFA 22	72,3	73	73,1	54,5	68,4	72,9	75	76,1	79,3	71,6
UFRGS 14	71,6	72	71,8	68,5	72	66,8	71,7	74,4	74,2	71,4
UPF 18	71,3	73	67,9	60,7	64,8	65,8	70,6	73,3	73	68,9
URS 21	74,6	73	75,5	73,2	63,2	73,5	77,4	75,1	81	74
Médias	72,4	74	73,9	70,4	67,5	70,6	75,5	76,4	78,3	73,2