Efeito do tipo de tutor e potássio no desenvolvimento da folha e inflorescência de seis genótipos de pimenteira-do-reino

Effect of type of tutor and potassium on leaf and inflorescence development of six black pepper genotypes

Efecto del tipo de tutor y potasio sobre el desarrollo de hojas e inflorescencias de seis genotipos de pimienta negra

Simone de Miranda Rodrigues

Doutora em Genética e Melhoramento

Instituição: Embrapa Amazônia Oriental

Endereço: Tv. Dr. Enéas Pinheiro, s/n, Marco, Belém, PA, CEP: 66095-903

E-mail: simone.rodrigues@embrapa.br

Oriel Filgueira de Lemos

Doutor em Genética e Melhoramento

Instituição: Embrapa Amazônia Oriental

Endereço: Tv. Dr. Enéas Pinheiro, s/n, Marco, Belém, PA, CEP: 66095-903

E-mail: oriel.lemos@embrapa.br

Joao Paulo Castanheira Lima Both

Doutor em Agronomia

Instituição: Embrapa Amazônia Oriental

Endereço: Tv. Dr. Enéas Pinheiro, s/n, Marco, Belém, PA, CEP: 66095-903

E-mail: joao.both@embrapa.br

Marli Costa Poltronieri

Mestre em Genética e Melhoramento

Instituição: Embrapa Amazônia Oriental

Endereço: Tv. Dr. Enéas Pinheiro, s/n, Marco, Belém, PA, CEP: 66095-903

E-mail: marli.poltronieri@embrapa.br

Sônia Maria Botelho Araújo

Doutora em Ciências Agrárias

Instituição: Embrapa Amazônia Oriental

Endereço: Tv. Dr. Enéas Pinheiro, s/n, Marco, Belém, PA, CEP: 66095-903

E-mail: sonia.botelho@embrapa.br

RESUMO

A gliricídia como tutor da pimenteira-do-reino promove a sustentabilidade do sistema de produção dessa espécie, juntamente com genótipos mais adaptados e produtivos a cada região. Logo, é necessário avaliar o comportamento de genótipos, já que caracteres morfoagronômicos estão associados ao desempenho de cada material genético, este trabalho teve como objetivo avaliar

caracteres morfológicos de crescimento e produção em dois tipos de tutores e duas concentrações de K₂O na nutrição das plantas. O experimento foi realizado em DBC, contendo três repetições, seis cultivares, dois tipos de tutores e duas doses de K₂O. Avaliou-se oito caracteres das plantas, sendo os dados submetidas à ANOVA com comparação de médias pelo teste de Tukey a 5%. Os genótipos apresentaram comportamentos diferentes, com maior influência do tipo de tutor do que da dosagem do adubo, resultando em maior desenvolvimento de caracteres morfológicos dos genótipos quando cultivados em gliricídia. O K₂O exerceu pouca influência no comportamento das plantas, mas foi possível verificar algum efeito desse adubo na laçará e Equador.

Palavras-chave: estação, *Gliricidia sepium*, *Piper nigrum* L., potássio, tutor vivo.

ABSTRACT

Gliricidia as a tutor for black pepper promotes the sustainability of the production system of this species, together with genotypes that are more adapted and productive to each region. Therefore, it is necessary to evaluate the behavior of genotypes, since morphoagronomic characters are associated with the performance of each genetic material. This work aimed to evaluate morphological characters of growth and production in two types of tutors and two concentrations of K₂O in plant nutrition. The experiment was carried out in DBC, containing three replications, six cultivars, two types of tutors and two doses of K₂O. Eight plant traits were evaluated, with the data submitted to ANOVA with comparison of means using the Tukey test at 5%. The genotypes showed different behaviors, with a greater influence of the type of tutor than of the fertilizer dosage, resulting in greater development of morphological characters of the genotypes when cultivated in gliricidia. K₂O had little influence on plant behavior, but it was possible to verify some effect of this fertilizer in laçará and Ecuador.

Keywords: wooden stake, *Gliricidia sepium*, *Piper nigrum* L., potassium, living tutor.

RESUMEN

La gliricidia como tutora de la pimienta negra promueve la sostenibilidad del sistema de producción de esta especie, junto con genotipos más adaptados y productivos a cada región. Por lo tanto, es necesario evaluar el comportamiento de los genotipos, ya que los caracteres morfoagronómicos están asociados con el desempeño de cada material genético. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar caracteres morfológicos de crecimiento y producción en dos tipos de tutores y dos concentraciones de K₂O en la nutrición vegetal. El experimento se llevó a cabo en DBC, conteniendo tres repeticiones, seis cultivares, dos tipos de tutores y dos dosis de K₂O. Se evaluaron ocho caracteres de las plantas, sometiénndose los datos a ANOVA con comparación de medias mediante la prueba de Tukey al 5%. Los genotipos mostraron comportamientos diferentes, con mayor influencia del tipo de tutor que de la dosis de fertilizante, resultando en un mayor desarrollo de los caracteres morfológicos de los genotipos cuando se cultivaron en gliricidia. El K₂O tuvo poca influencia en el comportamiento de las plantas, pero fue posible

verificar algún efecto de este fertilizante en laçará y Ecuador.

Palabras clave: estaca de madera, *Gliricidia sepium*, *Piper nigrum* L., potássio, tutor vivo.

1 INTRODUÇÃO

Introduzida da Índia, a pimenteira-do-reino (*Piper nigrum* L.) é uma das especiarias mais importantes comercializadas no mundo, com ampla utilização nas indústrias de agroalimentação, perfumaria e cosmética (Ravindran *et al.*, 2000). É considerado um produto de alto valor econômico, e o Brasil é o segundo maior produtor e exportador mundial do produto (IBGE, 2024). Há uma grande oscilação de preço da pimenta preta, variando de 1.400 a 9.000 dólares a tonelada no mercado internacional, sendo cultivada principalmente por agricultores familiares, por oferecer oportunidade de aumento da renda, fixação de mão de obra e melhoria de vida no campo.

É uma planta trepadeira que necessita de um tutor para o melhor desenvolvimento no campo e, tradicionalmente, o sistema de produção no Brasil usa tutor de estação de madeira, no qual a planta se fixa pelas raízes adventícias que nascem na região dos nós, chamadas de gavinhas. Este tipo de tutor encarece o cultivo da pimenteira-do-reino, limitando a renovação e a expansão de novos pimentais, em decorrência do elevado preço do estação e da dificuldade para sua aquisição, imposta pelas leis ambientais do país e da política de produtos agrícolas a partir de sistema de produção sustentável para o comércio internacional. Logo, ajustes no sistema de produção dessa cultura, com intuito de adequação às exigências de políticas governamentais, têm sido pesquisados (Rodrigues *et al.*, 2022).

Ishizuka (2003) propôs ajuste no sistema de produção utilizando gliricídia (*Gliricidia sepium* L.) como tutor vivo da pimenteira-do-reino, o qual vem sendo adequado (Menezes *et al.*, 2014) e adotado pelos agricultores à medida que práticas e informações técnicas são obtidas e socializadas, tais como a

caracterização, adaptabilidade e comportamento vegetativo e produtivo dos genótipos disponíveis.

Considerando que são duas plantas em desenvolvimento no sistema de produção, ambas, a pimenteira-do-reino e a gliricídia necessitam de água, luz e nutrientes para se desenvolverem, sendo necessário ajustes no sistema de nutrição focado na produção das plantas de pimenta, e manejo de ambas, principalmente das plantas de gliricídias por meio de podas para controle do sombreamento e uso da biomassa produzida para incorporação no solo, consequentemente ciclagem de nutrientes e aumento da matéria orgânica e vida do solo (Ishizuka *et al.*, 2004).

Em consequência, pesquisas envolvendo o uso de gliricídia como tutor vivo no sistema de produção da pimenta-do-reino foram realizados em três municípios do Pará, Igarapé-Açu (Rodrigues *et al.*, 2019), Baião (Lemos *et al.*, 2022) e Tomé-Açu (Rodrigues *et al.*, 2022), sendo avaliados os caracteres de crescimento e produção de clones e cultivares de pimenteira-do-reino, cuja ampliação dessas pesquisas são importante para a verificação do desenvolvimento e produção da pimenteira-do-reino em tutor vivo de gliricídia em outros municípios do estado, visando reforçar algumas vantagens do uso do tutor e obter mais informações técnicas para a consolidação do uso da gliricídia e dos genótipos mais adaptados e produtivos pelos os pipericultores.

Portanto, o objetivo desse trabalho foi caracterizar genótipos de pimenteira-do-reino quanto às variáveis morfológicas de crescimento e produção cultivados em dois tipos de tutores e duas concentrações de potássio no município de Castanhal-PA.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Informações sobre a necessidade nutricional da interação gliricídia-pimenteira-do-reino são escassas para os principais nutrientes, tanto que ainda não existe recomendação de NPK para este sistema de produção que usa gliricídia como tutor da pimenteira-do-reino, e o potássio possui grande

importância na fase de produção, sendo que a fonte mais usada desse adubo no solo é o cloreto de potássio (K_2O). Os poucos estudos existentes focaram na utilização de sistema nutricional para pimenteira-do-reino em estação de madeira. Naturalmente, tanto a pimenteira-do-reino quanto o tutor vivo requerem nutrientes, sugerindo ajustes no sistema nutricional para melhor adaptação, desenvolvimento e produção de genótipos dessa espécie cultivados nesse tutor.

Segundo Kato (1978), nitrogênio e potássio são os macronutrientes exigidos em maior quantidade pelas pimenteiras, e o potássio fornecido às plantas na forma de K_2O é essencial para o plantio das mudas, formação e manutenção das plantas e sustentação da produção. De acordo com as recomendações da Embrapa, a adubação usando esse nutriente requer 50 g no primeiro ano, 95 g no segundo ano, 149 g no terceiro ano e 180 g por planta a partir do quarto ano de cultivo das pimenteiras em tutor morto (Franzini *et al.*, 2014). Com a inserção do tutor de gliricídia há a necessidade de verificar o equilíbrio nutricional para evitar perdas de produtividade, redução de crescimento, eficiência do uso da água, vulnerabilidade às doenças, e conseqüentemente, a diminuição dos lucros do produtor.

Apesar da necessidade de realização de novas adequações no sistema nutricional, segundo Ishizuka *et al.* (2004), Menezes *et al.* (2014) e Moraes *et al.* (2018), o cultivo da pimenteira em gliricídia pode proporcionar vantagens no desenvolvimento das plantas, já que o tutor é uma leguminosa fixadora de nitrogênio, capaz de criar um microclima favorável à planta e ao trabalhador agrícola, possibilita a incorporação de matéria orgânica no solo, entre os períodos de manejo dos tutores, e é uma alternativa sustentável e barata de multiplicação desse tipo de estaca, atendendo às políticas governamentais com redução de riscos ao meio ambiente e aumento de sequestro de carbono pelo sistema de produção.

3 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada na área da Empresa TROPOC - Produtos Tropicais de Castanhal LTDA, localizada no município de Castanhal-PA, que apresenta clima do tipo Af, do tipo tropical chuvoso, e solo do tipo latossolo amarelo distrófico (Dantas, 2021). O preparo da área iniciou-se no segundo semestre de 2019, com aplicação de 3,7 ton por hectare de calcário dolomítico (PRNT 90%), seguido do preparo das leiras de 40 cm x 4,5 m x 110 m (A x L x C).

Os estações e as estacas de gliricídia (2,5 m e cerca de 8 cm de diâmetro) foram enterradas a 60 cm de profundidade no solo em dezembro de 2019, segundo recomendações de Ishizuka *et al.* (2004), que orienta o plantio em 60 cm das gliricídia, seguido de adubação com 5 L de cama aviária e 30 g de FTE BR-12 por cova (40 cm x 40 cm x 40 cm). As mudas foram plantadas em cada uma das três leiras em forma de fila dupla, com espaçamento de 2,20 m x 2,20 m, e 4 m entre as leiras. Um mês depois da implantação dos tutores, as mudas de pimenteira-do-reino foram plantadas a uma distância de 10 a 15 cm dos tutores. Foi aplicado superfosfato simples, nitrogênio e potássio conforme recomendação de Franzini *et al.* (2014).

O experimento em DBC consistiu em três repetições, seis genótipos e duas doses de K_2O em cada tipo de tutor para avaliar o efeito do potássio nos caracteres morfológicos de produção das plantas de pimenteira-do-reino. As doses de K_2O , forma disponibilizada pelo adubo, foram de 15 e 90 g dividida em partes iguais e aplicada em três vezes, no plantio, aos 30 e 60 dias após a implantação das mudas. Consideraram-se quatro plantas por cultivar e por dose de K_2O , e foram utilizados os genótipos Bragantina (Braga), Guajarina (Guaja), Uthirankotta (Uthi), cv. Embrapa (Clone Baionensis), laçará (laça) e Equador (Equa), fornecido por viveirista credenciado e parceiro da Embrapa.

Para a condução do experimento, consideraram-se três podas anuais das gliricídias e uso da biomassa como cobertura morta. As práticas culturais consistiram em roçagem da área, coroamento das plantas e retirada das

inflorescências no primeiro ano do experimento visando o desenvolvimento das plantas e maior produção no primeiro ciclo de produção. Os tratos culturais e a adubação das plantas foram mantidas anualmente conforme descrito, sendo acrescentado adubação com micronutriente, FTE 12 BR a 1 g.L^{-1} , antes do período de colheita, e nos meses de maio a junho de 2022 os dados foram obtidos para submissão às análises estatísticas.

Os fatores morfológicos avaliados foram Tamanho do Pecíolo, Comprimento da Folha, Largura da Folha, Espessura da Folha, Peso Fresco da Folha, Peso Seco da Folha, Comprimento do Pedúnculo e Tamanho da Inflorescência. As análises de variância (teste F) e comparação de média (teste Tukey a 5% de significância) foram realizadas usando o programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2019).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento, crescimento e produção das plantas de pimenteira-do-reino estão associados ao tipo de tutor, adubação, manejo das plantas, controle de pragas e doenças e ao genótipo, dentre outros. Portanto, a verificação da influência do tutor e da concentração de potássio sobre os caracteres morfológicos de crescimento e produção dos genótipos dessa espécie oferecem informações para a escolha do material a ser adotado na implantação do sistema de produção usando gliricídia no Pará.

Para cada genótipo (Cv) cultivado no tipo de tutor (T) e nas diferentes concentrações de potássio (C), as informações mostraram qualidade dos dados de campo, considerando o coeficiente de variação (CV%) obtido para cada caractere analisado (Tabela 1).

Tabela 1. Resumo de Anova realizada para oito características avaliadas: Pecíolo, Espessura lateral (Espess), Largura da folha (Largura), Comprimento da folha (Compr), Peso fresco da folha (P. fresco), Peso seco da folha (P. seco), Pedúnculo (Pedún) e Inflorescência (Inflor).

	Pecíolo	Espess	Largura	Compr	P. Fresco	P. Seco	Pedún	Inflor
CV (%)	38,88	15,97	15,81	10,71	29,34	35,64	34,91	17,30
Média geral	1,5571	0,3632	6,9784	12,5979	1,8679	0,7160	1,1121	10,5838
(Pr>Fc)								
T x Cv	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0001
Cv x C	0,9816	0,1441	0,6882	0,2704	0,3123	0,1936	0,0656	0,3225
T x Cv x C	0,9905	0,0010	0,3286	0,0145	0,0065	0,0000	0,2778	0,0937

Fonte: Produzido pelos autores (2025).

O desvio padrão dos dados sobre a média foi de 10,71% (Comprimento das folhas) a 38,88% (Comprimento do pecíolo), variando de médio a elevado (Pimentel-Gomes, 1985). Quanto menor a porcentagem do CV, menor a influência dos fatores não controlados sobre as variáveis analisadas, demonstrando qualidade dos dados. Segundo os parâmetros propostos por Pimentel-Gomes (1985), 50% dos dados obtidos tiveram um CV considerado médio, incluindo a Largura das folhas, a Espessura lateral das folhas e o Tamanho da inflorescência, além do Comprimento das folhas, enquanto 37,5% dos caracteres avaliados tiveram um CV considerado muito alto (Tabela 1).

Pesquisas semelhantes foram conduzidos nos municípios de Tomé-Açu, Igarapé-Açu e Baião no Estado do Pará (Both *et al.*, 2022; Lemos *et al.*, 2022; Rodrigues *et al.*, 2022) e apresentaram CVs (%) de caracteres morfológicos que variaram de baixo, CV (%) < 10, até valores considerados muito alto (33,23%) para tamanho do pecíolo.

Gontijo *et al.* (2012) encontraram CV (%) acima de 50% quando avaliaram a influência de micronutriente na produtividade da pimenteira-do-reino, enquanto Gomes Filho (2017) encontrou CV (%) considerado alto quanto à influência de óleos essenciais no impedimento do crescimento de *Fusarium solani* em pimenteira-do-reino.

Os padrões para CV (%) foram propostos para espécies modelos e/ou aquelas de grande impacto econômico, logo para demais espécies, é importante que seja realizado um levantamento bibliográfico da espécie alvo, e levada em

consideração às condições experimentais avaliadas, visando construir um padrão de confiabilidade dos dados para a espécie ou orientar alguns conjuntos de dados (Garcia, 1989).

Nesta pesquisa, os caracteres morfológicos dos diferentes genótipos de pimenteira-do-reino variaram para médias de tamanho de pecíolo equivalente a 1,56 cm, folhas com espessura de 0,36 mm, largura e comprimento de 6,98 cm e 12,60 cm, respectivamente. A inflorescência apresentou pedúnculo com 1,11 cm de comprimento e inflorescências com 10,58 cm, este último indicando comprimento desejável aos produtores (>10,0 cm). De modo geral, os caracteres avaliados não sofreram influência das concentrações de potássio usadas no solo, sendo verificada a interação tipo de tutor e concentração, no desenvolvimento de alguns caracteres (Tabela 1).

De modo que, o Comprimento do pecíolo em estação e 15 g de K_2O mostrou que Guajarina, cv. Embrapa, laçará e Bragantina desenvolveram os maiores pecíolos, com 1,68 cm, 1,45 cm, 1,45 cm e 1,37 cm, respectivamente. Entretanto, os pecíolos da cv. Embrapa, laçará e Bragantina não diferiram da Uthirankotta (1,14 cm) e Equador (0,95 cm), com os menores tamanhos. Para estação e 90 g de K_2O , pecíolos das cultivares com tamanho entre 1,35 a 1,66 cm foram considerados semelhantes. Usando 15 g de K_2O , laçará, cv. Embrapa e Bragantina não diferiram da Uthirankotta para esse caractere (Tabela 2). Em gliricídia, os genótipos tiveram maiores pecíolos com 15 g de K_2O . Bragantina, Guajarina, cv. Embrapa e Uthirankotta não diferiram entre si, mas cv. Embrapa e Uthirankotta também não diferiram da Equador e laçará. Ainda, usando 90 g de K_2O , Bragantina, Guajarina e Uthirankotta não diferiram entre si. Outrossim, Uthirankotta e cv. Embrapa não diferiram da Equador (1,52 cm) e laçará (1,51 cm), que apresentaram os menores tamanhos de pecíolos. Ressalta-se que em gliricídia, laçará apresentou comprimento de pecíolo menor do que quando cultivada em estação.

Comparando-se os genótipos nos dois tipos de tutores, observou-se que quando cultivados em tutor de gliricídia apresentaram maiores tamanhos de pecíolos independente da concentração de potássio. As demais cultivares, cv.

Embrapa e laçar não apresentaram diferena na mdia dos pecolos entre tutor vivo e morto cultivados nas duas concentraes de K_2O . Portanto, no houve influncia da concentrao de K_2O usado na adubao do solo para o tamanho do pecolo.

A largura da folha  uma caracterstica peculiar do gentipo. Entretanto, em estao e 15 g de K_2O verificou que Bragantina obteve folhas mais largas (8,05 cm), seguido da laar (6,53 cm), Guajarina (6,48 cm), cv. Embrapa (6,41 cm) e Uthirankotta (6,23 cm) que no diferiu de Equador (5,42 cm). Em estao e 90 g de K_2O , Bragantina (7,56 cm) e Guajarina (6,78 cm) apresentaram as folhas mais largas, mas Guajarina no diferiu da cv. Embrapa (6,33 cm), Uthirankotta (5,88 cm) e laar (5,88 cm); e Equador (5,05 cm) foi considerado semelhante s duas ltimas cultivares (Tabela 2).

Em gliricdia e 15 g de K_2O , a Largura das folhas foram maiores para Bragantina (10,20 cm), Guajarina (8,38 cm) e Uthirankotta (7,74 cm). Enquanto a cv. Embrapa no diferiu da mdia encontrada para Equador e laar. Em tutor vivo e 90 g, o comportamento foi semelhante para Bragantina (9,95 cm), Guajarina (7,92 cm), Uthirankotta (7,75 cm) e cv. Embrapa (7,11 cm), sendo que esta ltima no diferiu da Equador (6,51 cm). Destaca-se a Bragantina com folhas mais largas, independentemente do tipo de tutor e da concentrao de K_2O . Largura das folhas, geralmente,  maior quando cultivada em tutor de gliricdia. Exceto as folhas da cv. Embrapa a 15 g de K_2O e a laar, nas duas concentraes de K_2O , que no diferiram na largura das folhas nos dois tipos de tutores, todas as demais cultivares apresentaram folhas mais largas quando cultivadas em gliricdia, evidenciando a expanso das folhas nas condies proporcionadas s plantas de pimenteira-do-reino nesse tipo de tutor vivo, mas no sofreram influncia da concentrao de K_2O usado na adubao do solo.

O Comprimento das folhas em estao e 15 g de K_2O foi maior em laar (14,00 cm) e Guajarina (13,33 cm), enquanto Guajarina no diferiu da Bragantina. As cultivares Uthirankotta, cv. Embrapa e Equador apresentaram folhas mais curtas com 11,15 cm, 10,94 cm e 10,40 cm, respectivamente. Em tutor morto e 90 g de K_2O resultou em folhas mais compridas para Guajarina e

laçará, seguido da Bragantina, Uthirankotta e cv. Embrapa. Equador apresentou as folhas mais curtas (Tabela 2).

Tabela 2: Médias dos Tamanhos dos pecíolos (cm), Espessuras das folhas (mm), Larguras das folhas (cm), Comprimentos das folhas (cm), Peso fresco das folhas (g), Peso seco das folhas (g), Comprimento do pedúnculo (cm) e Tamanho das inflorescências de genótipos de pimenteira-do-reino cultivados em glicirídia e estação, com aplicação de duas concentrações de K₂O.

Concentração	Cultivar	Pecíolo	Espess	Largura	Compr	P. Fresco	P. Seco	Pedún	Inflor	
Estação	K ₂ O [15 g]	Equador	0,95 Bb	0,40 Aa*	5,41 Bc	10,40 Bc	1,03 Bc	0,43 Bc	0,73 Ab	9,14 Acd
		Uthirankotta	1,14 Bb	0,35 Aabc	6,23 Bbc	11,15 Bc	1,38 Bbc	0,50 Bbc	1,15 Ba	9,94 Acd
		Bragantina	1,37 Bab	0,32 Ac	8,05 Ba	12,42 Bb	1,92 Ba	0,95 Ba	0,91 Bab	14,93 Aa
		laçará	1,45 Aab	0,39 Aa	6,53 Ab	14,00 Aa*	1,77 Aab*	0,69 Ab*	1,16 Aa	10,38 Ac
		cv. Embrapa	1,45 Aab	0,33 Abc	6,41 Ab	10,95 Ac	1,46 Aabc	0,56 Bbc	0,77 Bb	8,65 Ad
	Guajarina	1,68 Ba	0,37 Aab'	6,48 Bb	13,33 Bab	1,68 Bab'	0,63 Bbc	1,04 Bab	12,85 Ab	
	K ₂ O [90 g]	Equador	0,96 Bc	0,37 Bab'	5,05 Bc	9,67 Bc	0,86 Bd	0,35 Bb	0,68 Ab	9,38 Ab
		Uthirankotta	1,06 Bbc	0,35 Ab	5,88 Bbc	11,18 Bb	1,31 Bcd	0,50 Bb	1,09 Ba	9,70 Ab
		Bragantina	1,35 Babc	0,35 Ab	7,56 Ba	11,76 Bb	1,86 Bab	0,85 Ba	1,05 Ba	14,03 Aa
		laçará	1,39 Aabc	0,37 Aab	5,88 Abc	13,06 Aa'	1,31 Acd'	0,50 Bb'	1,13 Aa	9,46 Ab
cv. Embrapa		1,49 Aab	0,34 Bb	6,33 Bb	10,88 Bb	1,41 Bbc	0,49 Bb	0,71 Bb	8,76 Ab	
Guajarina	1,66 Ba	0,41 Aa*	6,78 Bab	14,13 Ba	2,11 Ba*	0,75 Aa	1,14 Aa	12,84 Aa		
Glicirídia	K ₂ O [15 g]	Equador	1,50 Ab	0,41 Aa'	6,35 Ad	11,78 Ac	1,68 Ac	0,52 Ac	0,78 Ad	8,21 Ac
		Uthirankotta	1,72 Aab	0,35 Ab	7,74 Abc	13,33 Ab	2,03 Ac	0,86 Ab	1,58 Aa	9,44 Abc
		Bragantina	2,20 Aa	0,34 Ab	10,20 Aa	14,18 Ab	3,48 Aa	1,13 Aa	1,60 Aa'	14,10 Aa
		laçará	1,50 Ab	0,37 Aab	6,11 Ad	13,33 Ab	1,58 Ac	0,63 Ac	1,17 Abc	10,61 Ab*
		cv. Embrapa	1,77 Aab	0,33 Ab'	6,89 Acd	11,50 Ac	1,77 Ac	0,71 Abc	1,02 Acd	9,14 Abc*
	Guajarina	2,10 Aa	0,35 Ab	8,38 Ab	16,28 Aa	2,89 Ab	1,10 Aa*	1,40 Aab	13,35 Aa*	
	K ₂ O [90 g]	Equador	1,51 Ac	0,45 Aa*	6,51 Acd	11,4 Ae	1,72 Ac	0,52 Ac	0,77 Ac	8,10 Bc
		Uthirankotta	1,78 Aabc	0,37 Abc	7,75 Ab	12,61 Acd	2,08 Ac	0,85 Ab	1,43 Ab	9,35 Ac
		Bragantina	2,13 Aa	0,32 Ac	9,95 Aa	14,36 Ab	3,26 Aa	1,38 Aa	1,90 Aa*	13,55 Aa
		laçará	1,51 Ac	0,36 Abc	5,99 Ad	13,14 Ac	1,61 Ac	0,68 Abc	1,11 Ab	9,24 Ac'
cv. Embrapa		1,62 Abc	0,38 Ab*	7,11 Abc	11,95 Ade	1,97 Ac	0,85 Ab	1,17 Ab	7,97 Ac'	
Guajarina	2,10 Aab	0,34 Bbc	7,92 Ab	15,68 Aa	2,65 Ab	0,77 Ab'	1,21 Ab	10,91 Bb'		

Letras minúsculas comparam cultivares entre si dentro de um mesmo tipo de tutor [estação/glicirídia] + K₂O [15 g/90 g]. Letras maiúsculas comparam a mesma cultivar em uma determinada concentração nos dois tipos de tutores. (*) Indica qual tratamento de K₂O interferiu positivamente para uma determinada cultivar; (') Indica qual tratamento de K₂O interferiu negativamente para uma cultivar. Fonte: Produzido pelos autores (2025).

As plantas tiveram as folhas mais expandidas quando cultivadas em gliricídia. Tanto que em gliricídia e adubação de 15 g de K₂O, as folhas foram mais compridas em Guajarina (16,28 cm), seguido de Bragantina (14,18 cm), Uthirankotta (13,33 cm) e laçar (13,23 cm), maiores que Equador (11,78 cm) e cv. Embrapa (11,50 cm). Estas duas ltimas apresentaram folhas de menor comprimento. Tambm, em gliricídia e adubação de 90 g de K₂O, Guajarina (15,68 cm) apresentou o maior comprimento de folhas, seguido da Bragantina (14,36 cm) e laçar (13,14 cm). A Uthirankotta (12,61 cm) no diferiu da cv. Embrapa (11,95 cm) para este caractere. As folhas, em condiões de sombra, tendem a expandir a lmina foliar para realizar a fotossntese, fato que ocorreu na maioria dos gentipos cultivados em gliricídia, com exceão da cv. Embrapa cultivada com 15 g de K₂O e laçar cultivada nas duas concentraões de potssio, que tiveram comprimento das folhas similares, independente do tutor.

A espessura da lmina foliar variou de 0,32 mm a 0,45 mm, sendo a menor lmina para Bragantina cultivada a 15 g de K₂O em ambos os tutores e maior para Equador em gliricídia a 90 g de K₂O. A Espessura mdia das folhas em tutor morto a 15 g de K₂O mostrou que Equador (0,41 mm), laçar (0,39 mm), Guajarina (0,37 mm) e Uthirankotta (0,35 mm) apresentaram folhas mais grossas, mas as duas ltimas no diferiram da cv. Embrapa (0,33 mm). Ainda, em estaão, e 90 g de K₂O, Guajarina (0,41 mm), laçar (0,37 mm) e Equador (0,37 mm) foram as que apresentaram as folhas mais grossas. laçar e Equador no diferiram da Uthirankotta (0,35 mm), Bragantina (0,34 mm) e cv. Embrapa (0,34 mm), que apresentaram espessuras inferiores (Tabela 2).

A espessura das folhas das plantas quando cultivadas em tutor vivo e 15 g de K₂O foi maior em Equador (0,41 mm) e laçar (0,37 mm), mas esta ltima no diferiu da Guajarina (0,35 mm), Uthirankotta (0,35 mm), Bragantina (0,34 mm) e cv. Embrapa (0,33 mm), com menores espessuras das folhas. Ainda, em gliricídia e 90 g de K₂O, a espessura foi maior na Equador (0,45 mm), seguido da cv. Embrapa (0,38 mm). Mesmo com a menor espessura numrica, Bragantina (0,32 mm) no diferiu da Uthirankotta, laçar e Guajarina. No geral, a Equador possui plantas com folhas mais grossa que as demais cultivares,

independentemente do tipo de tutor e concentração de potássio usada no solo.

As condições de sombreamento proporcionadas pelas gliricídias favoreceram o espessamento das folhas mais que em estação como observado na cv. Embrapa (vivo = 0,38 mm; morto = 0,34 mm) e Equador (vivo = 0,45 mm; morto = 0,37 mm) em tutor vivo e 90 g de K₂O. A exceção foi a Guajarina que mostrou folhas mais espessas em estação. As demais cultivares não diferiram entre si, apesar do tipo de tutor e da concentração de K₂O usada.

A concentração de potássio influenciou a espessura das folhas de alguns genótipos, sendo maior em Equador em estação e 15 g de K₂O (0,40 mm) comparado a 90 g de K₂O (0,36 mm), enquanto que em tutor vivo ocorreu o inverso, mais espessas em 90 g de K₂O (0,45 mm) que em 15 g de K₂O (0,41 mm), o que sinaliza que há mais necessidade de potássio considerando uma menor atividade fotossintética em condições de sombreamento em relação a pleno sol. Fenologia semelhante foi observada na Guajarina em tutor morto a 90 g de K₂O (0,41 mm) e a 15 g de K₂O (0,37 mm). Igualmente, foi observado que a cv. Embrapa em tutor vivo e 90 g de K₂O apresentou folhas mais espessas (0,38 mm) que usando 15 g do adubo (0,33 mm). As demais cultivares em tutor vivo e morto não sofreram influência da concentração de K₂O na espessura das folhas.

O peso fresco das folhas variou de 0,86 g (Equador) a 1,92 g (Bragantina) quando as plantas foram cultivadas em tutor morto, e de 1,58 g (laçará) a 3,48 g (Bragantina) em tutor vivo, evidenciando um maior acúmulo de reservas nas folhas das plantas cultivadas em gliricídia, com destaque para Bragantina que apresentou maior peso em ambos os tutores (Tabela 2).

Ressalte-se que em estação e 15 g de K₂O, o maior peso fresco foi observado na Bragantina (1,92 g), seguida da laçará (1,77 g), Guajarina (1,68 g) e cv. Embrapa (1,46 g) que não diferiram de Uthirankotta (1,38 g). Enquanto usando 90 g de K₂O, Guajarina (2,11 g) e Bragantina (1,86 g) se destacaram com maior peso fresco, mas esta última não diferiu da cv. Embrapa (1,41 g).

As plantas cultivadas em tutor vivo apresentaram maiores pesos fresco das folhas em relação ao tutor morto. Ressalte-se que em 15 g de K₂O,

Bragantina (3,48 g) apresentou o maior peso fresco, seguido da Guajarina (2,89 g), Uthirankotta (2,03 g), cv. Embrapa (1,77 g), Equador (1,68 g) e laçarará (1,58 g). Padrão observado a 90 g de K₂O, com a Bragantina (3,26 g) apresentando o maior peso fresco e a laçarará (1,61 g) o menor.

O peso fresco foi superior em todos os demais genótipos sob o cultivo em tutor vivo, promovendo mais crescimento e desenvolvimento. Por outro lado, a adubação do solo exerceu influencia no peso fresco de folhas apenas na Guajarina (15 g de K₂O = 1,68 g; 90 g de K₂O = 2,11 g) e laçarará (15 g de K₂O = 1,77 g; 90 g de K₂O = 1,31 g), enquanto nos demais genótipos não houve o efeito da adubação sobre o peso das folhas.

Semelhante ao peso fresco, houve efeito do tipo de tutor para peso seco das folhas, com destaque para o tutor vivo que apresentou média variando de 0,52 g (Equador) a 1,38 g (Bragantina), enquanto em tutor morto (estacão) variou de 0,35 g (Equador) a 0,95 g (Bragantina).

Desse modo, em tutor morto e 15 g de K₂O, Bragantina (0,95 g) apresentou peso das folhas maior que laçarará (0,69 g), Guajarina (0,63 g), cv. Embrapa (0,56 g) e Uthirankotta (0,50 g), entretanto a Equador (0,43 g) não diferiu da Guajarina, cv. Embrapa e Uthirankotta. Em tutor morto e 90 g de K₂O, Bragantina (0,85 g) e Guajarina (0,75 g) foram os que apresentaram folhas secas mais pesadas, seguidos dos demais genótipos (Tabela 2).

Em gliricídia, Bragantina (1,13 g) e Guajarina (1,10 g) apresentaram maior média a 15 g de K₂O, seguidos de Uthirankotta (0,83 g) e cv. Embrapa (0,71 g), sendo que a última teve peso seco das folhas semelhante à laçarará (0,63 g) e Equador (0,52 g). Usando 90 g de K₂O, Bragantina (1,38 g) apresentou maior média, seguindo da Uthirankotta (0,85 g), cv. Embrapa (0,82 g), Guajarina (0,77 g) e laçarará (0,68 g), não diferindo da Equador (0,82 g).

O tipo de tutor para laçarará e Equador a 15 g de K₂O não exerceu influencia no peso seco das folhas desses genótipos, assim como Guajarina a 90 g de K₂O. As demais cultivares foram influenciadas pelo tipo de tutor, independente da concentração, com maiores pesos quando cultivados em gliricídia. A adubação com potássio teve efeito positivo no aumento do peso seco

de folhas em Guajarina cultivada em gliricídia em 15 g de K₂O e em laçar em esta na mesma concentra. As demais cultivares, independente do tutor, no sofreram influncia da concentra de potssio.

As folhas apresentaram pednculo variando de 0,68 cm a 1,90 cm, sendo maiores quando cultivados em gliricídia que alcanaram de 0,78 cm (Equador) a 1,90 cm (Bragantina), enquanto em esta variou de 0,68 cm (Bragantina) a 1,16 cm (laçar). O Comprimento do pednculo para o cultivo em tutor morto a 15 g de K₂O foram maiores para laçar, Uthirankotta, Guajarina e Bragantina. Entretanto, o tamanho mdio do pednculo da Guajarina e Bragantina no diferiu da cv. Embrapa (0,77 cm) e Equador (0,73 cm). Outrossim, em 90 g de K₂O foi encontrado maior comprimento do pednculo para Guajarina, laçar, Uthirankotta e Bragantina, enquanto Equador e cv. Embrapa apresentaram pednculos menores (Tabela 2).

Por outro lado, as plantas em gliricídia apresentaram maiores pednculos com 15 g de K₂O para Bragantina (1,60 cm), Uthirankotta (1,58 cm) e Guajarina (1,40 cm), esta ltima semelhante a laçar (1,17 cm). Todavia, o cultivo em gliricídia e 90 g de K₂O resultou em pednculos maiores para Bragantina (1,90 cm), seguido das cultivares Uthirankotta (1,42 cm), Guajarina (1,21 cm), cv. Embrapa (1,17 cm) e laçar (1,11 cm). Os menores pednculos foram encontrados na Equador, independente da condio de cultivo.

Equador e laçar no sofreram efeito do tutor independente da concentra do adubo para o Tamanho do pednculo. Todas as demais cultivares em 15 g ou 90 g de K₂O apresentaram maiores pednculos em gliricídia, indicando efeito do tutor sobre o caractere, e exceto a Bragantina em gliricídia, que apresentou maior pednculo comparado as plantas em 90 g de K₂O, nenhuma outra cultivar, independente do tutor, sofreu influncia da adubao de potssio no solo.

O comprimento da inflorescncia determina a quantidade de frutos que sero produzidos e discrimina os gentipos. Neste estudo, as maiores inflorescncia foram observadas na Bragantina (13,55 cm a 14,93 cm) e as menores na cv. Embrapa (7,97 cm a 8,65 cm) e Equador (8,10 cm a 8,21 cm).

Nas plantas em estação e 15 g de K₂O, destacou-se Bragantina, seguida da Guajarina, laçará, Uthirankotta e Equador, entretanto, Uthirankotta e Equador não diferiram da cv. Embrapa que apresentou inflorescência com menor média. Também, no cultivo em tutor morto a 90 g de K₂O, Bragantina (14,03 cm) se destacou seguida por Guajarina, Uthirankotta, laçará, Equador e cv. Embrapa.

As plantas cultivadas em tutor vivo a 15 g de K₂O que tiveram maiores inflorescências foram as dos genótipos Bragantina (14,10 cm) e Guajarina (13,35 cm), com inflorescências maiores que laçará, Uthirankotta e cv. Embrapa, entretanto, as duas últimas não divergiram estatisticamente da Equador. O cultivo em gliricídia a 90 g de K₂O também resultou em inflorescências maiores para Bragantina (13,55 cm), seguida da Guajarina (10,91 cm). De modo geral, os menores comprimentos de inflorescência foram encontrados na cv. Embrapa e os maiores na Bragantina, sem influência do tutor e da adubação no solo.

O tutor exerceu efeito no tamanho da inflorescência de alguns genótipos, pois para Equador e Guajarina a 90 g de K₂O, as inflorescências foram maiores em estação. Os demais genótipos tanto a 15 g ou 90 g de K₂O não tiveram a inflorescência influenciados pelo tutor. A adubação com potássio exerceu influencia na inflorescência promovendo maior desenvolvimento quando cultivado a 15 g K₂O para a cv. Embrapa, Guajarina e laçará em gliricídia. Os demais genótipos não sofreram influência da concentração do K₂O nos tutores.

Conceição *et al.* (2003) descreveram que Guajarina foi a cultivar que melhor se comportou em gliricídia, e Rodrigues *et al.* (2019), avaliando o comportamento de cultivares de pimenteira-do-reino em estação e gliricídia, identificaram que a cv. Uthirankotta apresentou produtividade maior em gliricídia do que em estação, além de melhor desenvolvimento das plantas.

Rodrigues *et al.* (2022) verificaram que em tutor vivo, as folhas mais largas foram encontradas em Bragantina seguida da cv. Embrapa, enquanto Cingapura apresentou as menores folhas. Esses autores verificaram que o cultivo em gliricídia contribuiu para o aumento do tamanho das espigas de Bragantina, Kuthiravally, Uthirankotta e cv. Embrapa. Em outro estudo, a gliricídia conferiu vantagem no tamanho e peso de espigas da Bragantina e Uthirankotta (Lemos

et al., 2022). No trabalho atual, laçará não sofreu influência do tipo de tutor para a largura e o comprimento das folhas, entretanto, os demais genótipos apresentaram folhas maiores quando cultivadas em gliricídia, e a inflorescência da Bragantina, laçará, Uthirankotta, cv. Embrapa e Guajarina não sofreram influência do tutor, indicando possibilidade de uso de gliricídia para essas cultivares, sem causar prejuízos no desenvolvimento e expansão das folhas.

A pimenteira-do-reino é bastante exigente nutricionalmente, principalmente quanto as concentrações de N, P, K. Atualmente, o que se usa para o cultivo consorciado entre pimenteira e gliricídia são as mesmas recomendações usadas para o cultivo em estação (Sim, 1971; Brasil *et al.*, 2020). No Brasil, pesquisas revelaram que uma planta adulta necessita de 120 g de potássio (K₂O) para manter a produção (Sim, 1971; Sadanandan, 2000), sendo essa concentração ainda muito utilizada no campo. A adubação é fundamental para proporcionar as plantas bom desenvolvimento morfológico e produtivo, e devem ser compatíveis tanto para o cultivo encontrado em estação quanto em tutor vivo, refletindo a lacuna necessária de informações para a melhoria do sistema de nutrição das plantas da pimenteira em gliricídia.

Dantas (2021), ao avaliar o desempenho fisiológico da pimenteira-do-reino em gliricídia e estação, e quatro concentração de K₂O, observou que plantas com oito meses de idade apresentaram as maiores taxas fotossintéticas e condutância estomática, na maioria das doses avaliadas (15, 30, 60 e 90 g/planta), entretanto, a transpiração das plantas se comportou semelhante nos dois tipos de tutores e na maioria das concentrações usadas.

A produção máxima de pimenta preta, 3,73 kg/planta, foi obtida com 175 g de K₂O para Cingapura em Tomé Açú (Oliveira; Cruz, 2001). Além de ser um dos nutriente mais requeridos pela pimenteira, está subordinado a perdas por lixiviação, reduzindo a probabilidade de acúmulos de K₂O no solo de um ano para o outro (Kato, 1978; Oliveira; Galvão, 1999; Oliveira; Cruz, 2001).

Veloso *et al.* (2000) verificaram que concentrações crescentes de K₂O reduziu o potássio encontrado nos tecidos foliares das pimenteiras, mas favoreceu o aumento da produção de grãos com 42, 13 e 22 Kg.ha⁻¹ de K₂O,

para Cingapura, Bragantina e Guajarina, respectivamente, evidenciando que os diferentes genótipos respondem diferente quanto a necessidade de potássio.

Como existem indicativos dos benefícios do uso da gliricídia no sistema de produção da pimenta-do-reino, dentre os quais redução da mortalidade e aumento da longevidade de plantas; redução dos custos de implantação de novos pimentais; aumento da matéria orgânica no solo, ciclagem de nutriente e consequente redução de adubação do solo por ser uma leguminosa, há a necessidade de adequação do sistema nutricional para o consórcio pimenteira-do-reino e gliricídia. Logo, estudos como o apresentado, que avaliam o desenvolvimento da planta face aos caracteres morfoagronômicos, permitem preencher lacunas existentes como a indicação de genótipos para mais adaptados a ampliação da adoção do tutor de gliricídia, entre os agricultores.

5 CONCLUSÃO

O tipo de tutor e a quantidade de potássio usada na adubação tem efeito no desenvolvimento de caracteres morfológicos de pimenteira-do-reino.

O cultivo em gliricídia favorece a expansão das folhas e desenvolvimento das inflorescências na maioria dos genótipos avaliados.

Bragantina, Guajarina, Uthirankotta e Equador apresentam pecíolo maiores em gliricídia, enquanto a cv. Embrapa e a laçará não sofrem influência do tutor.

laçará nas duas concentrações de K₂O e cv. Embrapa a 15 g de K₂O não sofrem influência do tutor para largura e comprimento das folhas. Demais genótipos têm maior taxa fotossintética com folhas maiores em gliricídia.

Inflorescências são maiores na Equador e Guajarina a 90 g de K₂O e estação.

laçará, cv. Embrapa e Guajarina apresentam inflorescências maiores em gliricídia e 15 g de K₂O.

A gliricídia como tutor da pimenteira-do-reino promove, na maioria dos genótipos, melhor desenvolvimento dos caracteres morfológicos das plantas.

O K₂O tem efeito para alguns caracteres em função do tipo de tutor. Em estação a 15 g de K₂O a Equador exhibe folhas mais espessas e a laçará tem folhas mais compridas, pesadas e maior peso seco.

AGRADECIMENTOS

À Embrapa em parceria com a TROPOC, o viveiro Promudas e o Banco da Amazônia pelo apoio e financiamento do projeto.

REFERÊNCIAS

BOTH, J.P.C.L. *et al.* Caracteres morfológicos e de produção dos clones Alencar e Equador de pimenteira-do-reino cultivados em tutor vivo de gliricídia em Tomé Açú, Estado do Pará. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, 2022.

BRASIL, E.C., CRAVO, M.S., MATOS, I.J. **Recomendações de calagem e adubação para o estado do Pará**. 2. ed. Brasília, DF; Embrapa, 2020.

CONCEIÇÃO, H.E.O. *et al.* Comportamento de cultivares de pimenteiras-do-reino em sistema de cultivo com uso de tutor vivo. Anais...**Embrapa**, 5p., 2003.

DANTAS, R.C.R. **Comportamento fisiológico e agrônômico de plantas de pimenteira-do-reino (*Piper nigrum*) cultivadas em gliricídia (*Gliricídia sepium* L.) sob doses de NPK**. Tese Doutorado, Belém, PA: UFRA, 62p. 2021.

FERREIRA, D.F. SISVAR: A computer analysis system to fixed effects split plot type designs. **Revista Brasileira de Biometria**, v. 37, n. 4, p. 529-535, 2019.

FRANZINI, V.I.; SILVA, A.R.B.; BOTELHO, S.M. **Área de plantio, Calagem e Adubação**. In: Boas práticas agrícolas para aumento da produtividade e qualidade da pimenta-do-reino no Estado do Pará. Embrapa, v. 52, 2014.

GARCIA, C.H. Tabelas para classificação do coeficiente de variação. Piracicaba: **Ipef**, 12p. (Circular técnica, 171), 1989.

GOMES FILHO, J. **Manejo da fusariose em pimenta-do-reino cv. Bragantina**. Dissertação de Mestrado. Rio Largo-Universidade Federal de Alagoas. UFA-Alagoas, p. 90, 2017.

GONTIJO, I. *et al.* Variabilidade e correlação espacial de micronutrientes e matéria orgânica do solo com a produtividade da pimenta-do-reino. Solo no Espaço e no Tempo. **Revista Brasileira de Ciências do Solo**, 36 (4), 2012.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/15/12034?tipo=grafico&indicador=12036>. Produção Agrícola - Lavoura Permanente.

ISHIZUKA, Y. CONCEIÇÃO, H.E.O.; DUARTE, M.L.R. Cultivo da Pimenteira-do-reino com Tutor Vivo de Gliricídia, Belém: **Embrapa Amazônia Oriental**: JICA, Documentos 182, 27 p, 2003.

ISHIZUKA, Y. *et al.* Sistema de cultivo sombreado. In: DUARTE, M. de L. R. Cultivo da pimenteira-do-reino na Região Norte. Belém, PA: **Embrapa Amazônia Oriental**. p. 83-89. Sistemas de produção, 2004.

KATO, A.K. **Teor e distribuição de N,P,K, Ca e Mg em pimenteiros-do-reino (*Piper nigrum* L.)**. Dissertação Mestrado, Piracicaba: ESALQ, 75p., 1978.

LEMOS, O.F. *et al.* Aspectos morfológicos de crescimento e produção de cultivares de pimenteira-doreino em tutor sustentável de gliricídia na mesorregião do Baixo Tocantins – Pará. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, 2022.

MENEZES, A.J.E.A. de. **Tutor vivo com gliricídia**. In: Boas práticas agrícolas para aumento da produtividade e qualidade da pimenta-do-reino no Estado do Pará. Brasília, DF: Embrapa, v. 52 p. 2014.

MORAES, A.J.G. *et al.* Avaliação dos impactos econômico, social e ambiental do cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia no estado do Pará. **Brazilian Journal of Development**, 4(7), 3696-3715, 2018.

PIMENTEL-GOMES, **Curso de Estatística Experimental**, 1985. Piracicaba-SP. ESALQ/USP, 1992.

RAVINDRAN, P.N.; BALACHANDRAN, I.; CHEMPAKAM, B. **Usos finais da pimenta**. In: RAVINDRAN, P.N. (ed.) Pimenta preta (*Piper nigrum* L.), pp. 467-479. Harwood Publicações Acadêmicas, Amsterdã. 2000.

RODRIGUES, S.M. *et al.* Avaliação de cultivares de pimenteira-do-reino (*Piper nigrum*) em dois tipos de tutores no município de Igarapé-Açu, Pará. **Embrapa Amazônia Oriental**. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 131, 2019.

RODRIGUES, S.M. *et al.* O tipo de tutor influencia nos caracteres de crescimento e produção de cultivares de pimenteira-do-reino no nordeste do Pará-Brasil. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 12, 2022.

SADANANDAN, A.K. **Agronomy and nutrition of black pepper**. Black Pepper: *Piper nigrum*, 163, 2000.

SIM, E.S. **Dry matter production and major nutrient contents of black pepper (*Piper nigrum*, L.) in Sarawak**. Malaysia Agricultural Journal, v.48, n.2, p.73-93, 1971.

VELOSO, C.A.C. *et al.* Resposta de cultivares de pimenta-do-reino aos nutrientes NPK em um latossolo amarelo da Amazônia oriental. **Scientia Agricola**, v.57, n.2, p.343-347, 2000.