EFEITO DA APLICAÇÃO VIA SOLO DE EXTRATO DA ALGA *ASCOPHYLLUM NODOSUM* EM VIDEIRA CULTIVADA EM SOLO CONTAMINADO POR COBRE

JEAN BRESSAN ALBARELLO¹; GEORGE WELLINGTON MELO²; JOVANI ZALAMENA³;
HISSASHI IWAMOTO⁴; JOSÉ ANTONIO MORAIS NETO⁵

INTRODUÇÃO

Em função do clima de algumas regiões produtoras de videira ser favorável ao ataque de fungos, o uso de fungicidas cúpricos é comum, sendo requerido até 24 pulverizações por safra, levando os teores de cobre no solo a níveis tóxicos às plantas (Shafer *et al.*, 2003).

Quando o cobre encontra-se em excesso nas plantas, causa problemas no metabolismo de carboidratos, nas reações da fotossíntese e na síntese de algumas proteínas, podendo inibir o crescimento das plantas (Marschner, 1995).

Extratos de algas marinhas são utilizados como bioestimulantes em algumas culturas, por serem ricos em hormônios e outras substâncias orgânicas que agem como estimulantes de crescimento das plantas, mesmo em condições adversas (Wu *et al.*, 1997).

Neste trabalho objetivou-se verificar o efeito da aplicação via solo de diferentes doses do extrato de *Ascophyllum nodosum* em mudas de videiras cultivadas em solo contaminado por cobre.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves - RS, em 2013. A cultivar utilizada foi a Niágara Branca. O solo foi classificado como Cambissolo e nele foi aplicada solução de sulfato de cobre para concentração de 150 mg de cobre por kg de solo.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco repetições, composto por seis doses de extrato de *Ascophyllum nodosum* (0; 0,15; 0,30; 0,40; 0,45; 0,60 %). Utilizou-se duas testemunhas sem adição de cobre no solo, sendo numa delas aplicado solução de extrato de algas 0,40 % (T1) e na outra testemunha não aplicou-se o extrato (T2). O extrato de algas foi

¹Estudante, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, RS; e-mail: jeanalbarello@gmail.com;

²Pesquisador, Embrapa Uva e Vinho, Bento Gonçalves, RS; e-mail: wellington.melo@embrapa.br;

³Estudante, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS; e-mail: jovanzalamena@yahoo.com.br;

⁴Estudante, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, RS; e-mail: hissashi.mobile@gmail.com;

⁵Estudante, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, RS; e-mail: jose2.0morais@gmail.com

aplicado no solo três dias após o plantio em volume de 10 mL. O experimento consistiu em dois ciclos de cultivo.

No primeiro ciclo, fizeram-se três medições de crescimento, em intervalos de sete dias, a partir de 34 dias após o plantio (DAP). Após as medições de crescimento, podou-se a parte aérea deixando-se duas gemas por planta para brotarem novamente, e colocou-se a poda em estufa para determinação de massa seca.

No segundo ciclo, as medições de crescimento iniciaram aos 18 dias após a brotação (DAB), em intervalos de sete dias, totalizando cinco medições. Ao término das medições, coletou-se a parte aérea para determinação de massa seca.

Os dados obtidos nas avaliações foram submetidos à análise de variância e comparação das médias pelo teste de Tukey (5%), utilizando o software computacional Statistical Analysis System (SAS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como pode ser observado na Tabela 1, houve diferença significativa apenas para a produção de matéria seca no segundo ciclo de cultivo, onde o tratamento com extrato de *Ascophyllum nodosum* em concentração de 0,15 % foi superior ao tratamento com extrato de alga a 0,60%. Os demais tratamentos não diferiram entre si.

Para as demais variáveis avaliadas, além de o extrato de *Ascophyllum nodosum* não ter causado nenhum efeito, as plantas das testemunhas sem adição de cobre ao solo comportaram-se da mesma maneira que as plantas cultivadas em solo contaminado por cobre.

Tabela – 1: Altura (cm) e produção de massa seca (g) das plantas de videira cultivadas em solo com alto nível de cobre e submetidas a doses de extrato de algas.

	Dose de Extrato de <i>Ascophyllum nodosum</i> (%)							
	0	0,15	0,30	0,40	0,45	0,60	T1	T2
	Primeiro Ciclo							
Altura 34 DAP (cm)	33,9a	41,7a	38,3a	42,6a	38,8a	30,4a	30,1a	41,9a
Altura 41 DAP (cm)	62,0a	77,6a	69,6a	77,0a	65,8a	56,2a	61,4a	77,4a
Altura 48 DAP (cm)	103,2a	126,0a	115,0a	120,2a	112,0a	98,4a	106,4a	121,4a
Massa Seca (g)	4,4a	5,7a	5,1a	5,4a	4,6a	3,8a	4,3a	5,6a
	Segundo Ciclo							
Altura 18 DAB (cm)	15,7a	22,4a	26,8a	29,8a	25,8a	23,4a	17,2a	26,0a
Altura 25 DAB (cm)	45,6a	63,0a	68,0a	71,0a	56,8a	55,2a	49,8a	64,0a
Altura 32 DAB (cm)	62,8a	87,4a	89,8a	91,2a	73,8a	70,2a	72,0a	80,6a
Altura 39 DAB (cm)	89,2a	117,0a	118,0a	117,8a	97,2a	94,6a	105,0a	89,2a
Altura 46 DAB (cm)	109,4a	149,0a	140,8a	136,0a	116,0a	116,0a	126,0a	116,4a
Massa Seca (g)	11,1ab	11,7a	11,0ab	10,0ab	8,3ab	7,9b	10,0ab	8,4ab

Médias seguidas da mesma letra, maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).

CONCLUSÕES

A aplicação do extrato de *Ascophyllum nodosum* não influenciou o crescimento e a produção de matéria seca das videiras.

A quantidade de cobre adicionada ao solo não gerou fitotoxicidade.

REFERÊNCIAS

MARSCHNER, H. **Mineral nutrition of higher plants**. San Diego: Academic Press, 1995. 889 p.

SCHAFFER JÚNIOR, A.; MELO, G. W.; CÉSARO, A. **Influência do excesso de cobre em dois tipos de solo sobre o porta-enxerto Paulsen 1103 em casa de vegetação**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 10.; SEMINÁRIOS CYTED: INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA VITÍCOLA E VINÍCOLA NA COR DOS VINHOS, 1., 2003, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2003. p. 175. (Embrapa Uva e Vinho. Documentos, 40).

Wu, Y.; Jenkins, T.; Blunden, G.; Whapham, C. & Hankins, S.D. **The role of betains in alkaline extracts of *Ascophyllum nodosum* in reduction of *Meloidogyne javanica* and *M. incognita* infestations of tomato plants**. Fundamental and Applied Nematology 20: 99-102. 1997.