



MANILKARA ADANS. (SAPOTACEAE) NO BRASIL, COM ÊNFASE NA REGIÃO AMAZÔNICA, A DISTRIBUIÇÃO FITOGEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES DESSE GÊNERO.

A família Sapotaceae apresenta um alto valor quando se diz respeito à importância na Amazônia, por se tratar de uma espécie que está ligada com atividades ecologicamente importantes, além de possuir uso potencial para a produção de madeira de qualidade, látex e outros produtos. As coletas botânicas representam expressiva importância na identificação das espécies, pois possibilitam a identificação taxonômica e registram informações sobre a planta para auxiliar diversos estudos. Esse trabalho tem como objetivo avaliar ocorrências de espécies do gênero *Manilkara* no bioma Amazônia, com o intuito de conhecer sua distribuição fitogeográfica e identificar as lacunas de conhecimento relacionados à distribuição desse gênero. Foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando plataformas como CAPES, Google Acadêmico e repositórios institucionais compilando informações de ocorrências no Brasil, com destaque para a Amazônia. O gênero *Manilkara* apresenta 17 espécies registradas no Brasil. Foram catalogadas oito espécies na Amazônia, sendo que *M. elata* (Allemão ex Miq.) Monach. apresentou ocorrência, principalmente, nos estados do Amapá, Pará e Rondônia, além de alguns estados da Mata Atlântica; *M. zapota* (L.) P.Royen é uma espécie cultivada que ocorre nos estados do Amazonas, Amapá e Pará, assim como em outros domínios fitogeográficos como a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica; *M. triflora* (Allemão) Monach., evidencia maior ocorrência no estado do Pará, mas também ocorre nos biomas da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica; *M. paraensis* (Huber) Standl., apresenta ocorrência confirmada no norte e no nordeste do Brasil, mais precisamente nos estados do Pará e Maranhão, respectivamente; *M. inundata* (Ducke) Ducke, ocorre nos estados do Acre, Amazonas, Roraima e Mato Grosso; *M. excelsa* (Ducke) Standl., ocorre especialmente nos estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso; *M. cavalcantei* Pires & W.A.Rodrigues ex T.D.Penn., estão presentes nos estados do Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí; e *M. bidentata* (A.DC.) A.Chev., ocorre em quase todos os Estados da região norte, com exceção de Rondônia e Tocantins. Sendo assim, pode-se perceber que o gênero *Manilkara* apresenta expressiva ocorrência na região amazônica, pois representa 47% do total de espécies registradas no Brasil. Esses dados darão suporte às programações de coletas para incremento dos herbários, com informações sobre o gênero, e subsídio para elaboração de projetos de manejo e restauração de áreas degradadas pela exploração florestal.

Autor: Camilly Barbosa da Silva - camillybarbosa0907@gmail.com

Co-Autores: Fernanda Ilkil Borges - fernanda.ilkiu@embrapa.br - EMBRAPA, Adson Jordan Moreira Correa - ad.jordan.art@gmail.com - Universidade Federal Rural da Amazônia, Brenda Fernandes Vidigal - brenadavidigal@gmail.com - Universidade Federal do Pará, Richard Rodrigues Miranda Florenzano - richard.ufra@gmail.com - Universidade Federal Rural da Amazônia, Vitor Sedovim Santos - vitor.sedovim@gmail.com - Universidade do Estado do Pará

Palavras-chave: Amazônia; fitogeografia; maçaranduba