

AVALIAÇÃO DE CORDEIRAS DAS RAÇAS CRIOULA LANADA E CORRIEDALE MANTIDAS EM CAMPO NATURAL. 1. MEDIDAS *IN VIVO* E NA CARÇAÇA

C.M.S.L.VAZ¹ (E Mail: clarav@cppsul.embrapa.br); E.N.MUNIZ²; P.A.BRICARELLO³; S.CARVALHO⁴.

¹Embrapa Pecuária Sul; ²FCAV, UNESP; ³UFV.

O comércio de ovinos para abate é feito mediante a escolha do animal vivo pelo fenótipo, assumindo importância relevante o tamanho e a condição corporal. Neste trabalho pretendeu-se quantificar algumas medidas corporais e de carcaças de cordeiras das raças Crioula Lanada, considerada uma raça nativa e Corriedale, genótipo especializado na produção de carne e lã, sendo ainda a raça mais difundida na região sul do Brasil, ambas pertencentes à Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, Rio Grande do Sul. Foram utilizados oito animais por raça, com sete meses de idade, criados em campo natural composto principalmente por *Axonopus affinis*, *Paspalum notatum* e a invasora conhecida por capim Annoni (*Eragrostis plana*). Ao desmame foram dosificados, permanecendo na mesma área por nove semanas sem medicação anti-helmíntica, quando foram abatidos. As medidas *in vivo* foram realizadas momentos antes do abate e as medidas de carcaça após o resfriamento, em câmara frigorífica a 2°C, por 24 horas. Obteve-se as seguintes médias, (\pm erro padrão) em cm. Medidas *in vivo*: comprimento corporal: 54,69 (\pm 2,73) e 52,81 (\pm 2,72); perímetro torácico: 64,06 (\pm 4,72) e 63,56 (\pm 2,95); altura: 52,63 (\pm 3,11) e 53,56 (\pm 3,22); comprimento de perna: 47,38 (\pm 3,02) e 47,19 (\pm 3,64). Medidas na carcaça: Comprimento: 49,6 (\pm 2,48) e 48,03 (\pm 2,18); comprimento de quarto: 31,63 (\pm 1,50) e 31,74 (\pm 1,08); profundidade de peito: 22,15 (\pm 1,03) e 22,51 (\pm 4,54); compactidade (kg/cm): 133,26 (\pm 19,91) e 117,35 (\pm 11,49) para Crioula e Corriedale, respectivamente. Para todas as variáveis estudadas, não foram encontradas diferenças significativas ($P \geq 0,05$) entre os fenótipos. Sob condições naturais de manejo extensivo de criação, as cordeiras das raças Crioula Lanada e Corriedale apresentaram medidas de corpo (*in vivo*) e de carcaça semelhantes, quando realizadas com animais apresentando mesma idade e manejo sanitário.

Palavras-chave: Ovinos crioulos, carcaça, condição corporal