

DOENÇAS DA PUPUNHA EM ÁREAS IRRIGADAS NA REGIÃO DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO. S.C.C. de H. TAVARES, A.R. NASCIMENTO, J.A.S. LIMA, W. A. MENEZES & S. C. da CRUZ. (Embrapa Semi-Árido, C.P. 23, 56300-000, Petrolina-PE). Diseases of peath palm in irrigated areas of the "Submédio" São Francisco region

A pupunha (*Bactris gasipaes*) é uma palmeira com larga distribuição na América do Sul. No semi-árido nordestino, mais precisamente na região do Submédio São Francisco, foi introduzida em 1991, pela Embrapa Semi-Árido, para produção racional de palmito, apresentando bons resultados de

adaptação e produção. Visando conhecer o estado fitossanitário desta cultura, acompanhou-se, durante o período de 1995 a 1997, viveiros e pomares da região. Amostras de plantas com sintomas foram coletadas e levadas ao laboratório de fitopatologia da Embrapa Semi-Árido, para análise e diagnóstico. Entre os materiais encontrados no viveiro, diagnosticou-se a presença de *Colletotrichum* sp. e *Alternaria* sp. causando queima das folhas. No campo, em plantas com um ano de idade, observou-se a presença de *Phytophthora* sp., expressando podridão no colo da planta e *Alternaria* sp., *Cladosporium* sp., *Curvularia* sp. e *Macrophoma* sp., causando lesões necróticas em folhas.