

Área: Ecologia

FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DA TRAÇA-DOS-CACHOS EM UVA DE VINHO CONDUZIDO NO SISTEMA DE LATADA

Fabiana Silva Batista (UPE); **Keliane Carvalho da Silva** (UPE); **Andréa Nunes Moreira** (CEFET); **Janaina dos Reis Miranda** (CEFET); **José Eudes de Moraes Oliveira** (Embrapa Semi-Árido)

Resumo

A CULTURA DA VIDEIRA EXISTE DIVERSIDADE ENTRE SISTEMAS DE CONDUÇÃO O QUE DEPENDE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, TIPOS DE SOLO, TRATOS CULTURAIS, TOPOGRAFIA, BEM COMO A VARIEDADE DE UVA. NO VALE DO SÃO FRANCISCO UM DOS SISTEMAS EMPREGADOS É O DE LATADA, CUJO DOSSEL É HORIZONTAL E AS PLANTAS SÃO ALINHADAS EM FILEIRAS DISTANCIADAS DE 2,0 A 3,0 M ENTRE FILAS E ESPAÇAMENTO DE 1,5 A 2,0 M ENTRE PLANTAS. ESSE TIPO DE CONDUÇÃO PROPORCIONA ELEVADO NÚMERO DE CACHOS, PRODUTIVIDADE, BOA RENTABILIDADE ECONÔMICA E FÁCIL ADAPTAÇÃO À TOPOGRAFIA. NO ENTANTO, OS CUSTOS DE INSTALAÇÕES SÃO ELEVADOS, E O SOMBREAMENTO FOLIAR PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A QUALIDADE DA UVA E DO VINHO, BEM COMO, O SURGIMENTO DE PRAGAS ENTRE AS QUAIS, A TRAÇA DOS CACHOS *Cryptoblabes gnidiella*. PRAGA ESSA QUE VEM CAUSANDO DANOS SIGNIFICATIVOS AOS PRODUTORES DESTA REGIÃO. AS LAGARTAS ALOJAM-SE NO INTERIOR DAS BAGAS E SE ALIMENTAM DA CASCA, DO ENGAÇO E FRUTOS, PROVOCANDO O MURCHAMENTO E A QUEDA DAS BAGAS, GERANDO PERDAS NA PRODUÇÃO, QUALIDADE E APARÊNCIA DOS CACHOS, PODENDO COMPROMETER A PRODUÇÃO E A QUALIDADE DO VINHO. COM O OBJETIVO DE ANALISAR A FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DESSA PRAGA, OBSERVOU-SE A SUA OCORRÊNCIA NO SISTEMA DE CONDUÇÃO LATADA DE UVA DE VINHO, VARIEDADE CHENIN BLANC NA FAZENDA MILANO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA – PE. FORAM COLETADOS VINTE CACHOS DE UVAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2007. AS AMOSTRAS FORAM ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL, EM SEGUIDA LEVADOS AO LABORATÓRIO E EXAMINADOS SOBRE MICROSCÓPIO PARA CONTAGEM DE NÚMERO DE OVOS. VERIFICOU-SE UMA INCIDÊNCIA DE 8,6 – 5,0 – 6,2 – 1,8 – 1,1 – 0,8 E 0,3 OVOS/CACHO QUANDO OS CACHOS DE UVA ESTAVAM COM, 58, 65, 68, 80, 88, 92, DIAS APÓS A PODA, RESPECTIVAMENTE, COM MÉDIA FINAL DE 3,4 OVOS/CACHO EM TODO PERÍODO.

Palavras-chave: *Cryptoblabes gnidiella*, monitoramento, pragas da videira