

AMOSTRAGEM DE OVOS DE *Cryptoblabes gnidiella* (MILLIÈRE, 1867) (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) EM DIFERENTES IDADES DE CACHOS DE VIDEIRA

Janaina dos Reis Miranda¹ - janaina-jua@hotmail.com

Lêda Lopes de Lima² - ledalopes@hotmail.com

José Eudes de Moraes Oliveira³ - jose.eudes@cpatsa.embrapa.br

Flávia Rabelo Barbosa³ - flavia@cpatsa.embrapa.br

Sivaldo Nascimento Pereira³ - sivaldo@cpatsa.embrapa.br

Jaime Luiz Albuquerque Conceição⁴ - jaime@ipa.br

¹Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina – CEFET-Petrolina, Rodovia BR 235 Km 22, PISNC - N4, CEP: 56.300-000, Petrolina-PE.

²Faculdade de Formação de Professores de Petrolina. Universidade de Pernambuco. BR 203, Km 2, Campus Universitário C.P. 66, CEP 56300-000, Petrolina-PE.

³Embrapa Semi-Árido, BR 428, Km 152, Caixa Postal, 23. CEP: 56.302-970. Petrolina, PE.

⁴Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária – IPA – Av. das Nações, s/n, Centro Agropecuário, CEP: 56.300-000, Petrolina-PE.

Dentre os problemas fitossanitários enfrentados na cultura da uva no Submédio São Francisco, a traça-dos-cachos *Cryptoblabes gnidiella* vem provocando danos significativos, principalmente nos frutos destinados à produção de vinho. As lagartas se alojam no interior dos cachos, se alimentam da casca do engaço e dos frutos, causando o murchamento, rompimento e queda de bagas, resultando no extravasamento do suco, proliferando bactérias que provocam a podridão ácida. Com o objetivo de atender as exigências da Produção Integrada de Uva (PI-Uva) se faz necessário definir o momento correto de controle dessa praga. Dessa forma, foram realizadas amostragens de ovos em quatro idades de cachos da uva (45, 52, 55 e 60 dias). Os cachos de uva foram coletados em campo e em seguidas levadas ao laboratório, onde passaram por triagem e contagem de ovos. Verificou-se que em cachos com até 45 dias 3,49 ovos/cacho, sendo crescente quando estavam com 52 e 55 dias, de 13 e 13,98 ovos/cacho, respectivamente, reduzindo para 9,38 ovos/cacho aos 60 dias, sugerindo, portanto, que a partir dessa idade ocorre à eclosão das lagartas, sendo o momento ideal para ser efetuado o controle.

Palavras-chave: Produção Integrada de Uva, pragas de videira, decisão de controle.