



Resumo

MELASTOMATACEAE DO PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL

Autores:

Cinara Araújo Faria (1), Taciana Barbosa Cavalcanti (2)

Filiação:

1. Universidade de Brasília, Pós-graduação em Botânica, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências ala sul, Brasília, DF, Brasil, 2. Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF, Brasil

Palavras Chave:

Melastomataceae, cerrado, Parque Nacional de Brasília

Resumo:

As Melastomataceae são bem representadas no Brasil com aproximadamente 1.500 espécies ocorrendo em praticamente todas as formações vegetacionais. O objetivo do trabalho é realizar o levantamento das espécies de Melastomataceae que ocorrem no Parque Nacional de Brasília, unidade de conservação pouco conhecida em termos de informações de composição florística. O Parque Nacional de Brasília (PNB) é classificado como Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral. Está inserido na região administrativa de Brasília (15°35'-15°45' S, 47°55'-48°55' W) e foi criado pelo decreto nº 241, de 29 de novembro de 1961, com 30.000 ha. A partir do decreto de nº 679 a área do PNB aumentará para 41.000 ha. A flora do PNB é típica do Cerrado apresentando seis fitofisionomias deste bioma: mata de galeria, mata seca, cerrado sensu stricto, campo sujo, campo limpo e campo de murundu. O clima é tropical com precipitação média anual de 1.600 mm. O trabalho de campo teve a duração de 12 meses, com coletas realizadas de forma aleatória, procurando abranger todas as fitofisionomias. Foram coletadas 4-5 amostras, quando possível, de cada indivíduo com botões florais, flores e/ou frutos. Todo o material coletado foi incorporado ao Herbário CEN. Foi realizado também o levantamento de coletas realizadas no PNB nos quatro herbários do DF. As Melastomataceae estão representadas no Parque Nacional de Brasília por 16 gêneros e 50 espécies, distribuídas por todas as formações vegetacionais do Parque. Os gêneros com maior número de espécies são Miconia (13), Microlicia (12), Tibouchina (6), Lavoisiera (3), Cambessedesia (2), Comolia (2), Pterolepis (2) e Trembleya (2) enquanto que Acisanthera, Chaetostoma, Desmocelis, Leandra, Macairea, Ossaea, Tococa e Rhynchanthera estão representadas por uma única espécie cada. (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, FUNARBE, CAPES, CNPq)