

COMPORTAMENTO DE LINHAGENS DE CAUPI DE COR, RAMADOR, EM GOIANIRA (GO) E CINCO LOCAIS DO NORDESTE - 1988. R. BEVITORI; I.F. ROCHA; R.J. GUAZZELLI & G.P. RIOS (EMBRAPA-CNPAF, Cx. Postal 179, 74001 - Goiânia, GO). Behavior of cowpea lines in Goianira (GO) and five locations in the Northeast - 1988 (color, prostrate).

Foram conduzidos, em 1988, pelo CNPAF (Goianira, GO), EPACE (Quixadá, CE), EMAPA (Pinheiro, Bacabal e Alto Turi - MA) e EMPARN (Pau dos Ferros), nove ensaios com sete linhagens de caupi de cor, ramador, oriundas do programa de caupi do CNPAF. Como testemunhas utilizaram-se as cultivares Seridô, BR 10-Piauï, João Paulo II, EPACE 9 e IPA 201. Efetuou-se a análise conjunta de acordo com o QM Resíduo da análise de variância de cada experimento. Houve efeito significativo de local, de linhagem e da interação local x linhagem sobre o rendimento. As médias por local variaram de 117 kg/ha (Alto Turi) a 1250 kg/ha (Bacabal). A linhagem CNCx 249-270F foi a mais produtiva em Bacabal, Pau dos Ferros e Goianira ou esteve entre as mais produtivas (2a. em Quixadá e Alto Turi; 3a. em Pinheiro), superando a média das testemunhas em 49%. Destacaram-se também CNCx 153-3F e CNCx 252-1E/FV na maioria dos locais.