PARECENÇA ENTRE ACESSOS DE FEIJOEIRO COMUM DE GRÃOS BRANCO UTILIZANDO O MÉTODO DE HARRISON.

Jaison Pereira de Oliveira¹, Maria José Del Peloso¹, Orlando Peixoto de Moraes¹,
Jaime Roberto Fonseca¹, Heloisa Torres da Silva, Leonardo Cunha Melo¹,

Silvando Carlos da Silva¹

¹Embrapa Arroz e Feijão - jaison@cnpaf.embrapa.br

Palavras chave: distância genética, análise multivariada, similaridade genética, variáveis categóricas, *Phaseolus vulgaris*.

O banco ativo de germoplasma (BAG) da Embrapa Arroz e Feijão, praticamente só possui informações subjetivas provenientes das cadernetas de coletas. Modelos matemáticos relacionando a pareceria entre acessos, utilizando variáveis subjetivas, tem sido poucos explorados nos estudos de recursos genéticos. A pareceria é dividida em duas categorias, similaridade e dissimilaridade. Modelos que levam em consideração o par (0,0), podem ter o valor do coeficiente de pareceria enviesado devido ao elevado número de coincidências de zeros. O objetivo deste trabalho foi estudar o coeficiente de pareceria através da aplicação do modelo de Harrison, em variáveis qualitativas multicategóricas. Foram utilizados 18 acessos tradicionais de feijoeiro comum de grãos branco do BAG-Embrapa Arroz e Feijão. Os descritores, hábito de crescimento (HC), tamanho de grão (TG), unidade federativa (UF), classe de solo (CS) e classe de altitude (CA), foram transformados em variáveis binárias através da criação de variáveis fictícias. No modelo de Harrison, cada variável é ponderada pelo número de níveis que possui atenuada pelo cálculo do seu logaritmo, possibilitando uma maior exatidão da distância entre dois acessos. As frequências relativas de similaridade encontradas nos descritores foram de 23,0% para sete níveis (HC e UF), 19,0% para cinco níveis (HC e UF) e 16,0% para quatro níveis (TG). Esta análise mostrou que descritores com muitos níveis contribui com maior frequência relativa para a similaridade no caso de coincidência entre dois acessos. Os acessos 9 e 10 são redundantes. A maior similaridade foi encontrada entre os acessos 1, 2 e 3 (0,77). A maior dissimilaridade foi do acesso 5, variando de 0,65 a 1,00. O método de Harrison possibilitou detectar acessos redundantes sendo uma ferramenta de decisão e definição no descarte de genótipos iguais.

Fonte financiadora: Embrapa Arroz e Feijão.