

Resultados de Busca

	título	autores
+	Desenvolvimento pós-embriônico: número de instares larvais em <i>Freeseomella varia</i> (Hymenoptera: Apidae)	Souza, C.C.M. de; Baptistella, A.R.T.O.; Santana, W.C.; Akatsu, I.P.; Soares, A.E.E.
+	Estudo da fauna de Calliphoridae (Diptera) presente em um ecossistema cadavérico em área de cerrado do Distrito Federal	Soares, M.N.T.; Santana, F.H.A; Pujol-luz, J.R.
+	Redescrição do macho de <i>Glycaspis brimblecombei</i> Moore, 1984 (Hemiptera: Psyllidae)	Favaro, R. M.; Zanol K. M. R; Santana D. L. O 1685-635
+	Ocorrência de <i>Beauveria</i> sp em <i>Glycaspis brimblecombei</i> Moore, 1984 (Hemiptera: Psyllidae)	Favaro, R. M.; Zanol K. M. R; Santana D. L. O 1685-635
+	Diversidade de Formigas (Hymenoptera: Formicidae) arbóricolas, em áreas de Mata do Planalto Conquistense, Bahia.	Conceicao, E.S.da; Santana, S.; Costa-Neto, A.de O.; Nascimento, I.C do; Delabie, J.H.C.; Oliveira, R.M.de; Andrade, F. P.
+	Estratégias ecológicas: densidade populacional em colônias de Meliponini (Hymenoptera: Apidae)	Santana, W.C.; Soares, A.E.E.
+	Mesofauna como bioindicadores em estudos de recuperação de áreas degradadas	Santana, D. L. O.; Faria, F. D.; Maia, C. M. B. F. Favaro R. M.; Silva, L. G. C.; Brites R.M. 412-12
+	Avaliação de mesofauna em diferentes sistemas de compostagem de serragem	Santana, D. L. de O.; Wink, C.; Andrade, F. M.; Rocha, A. L. J. L.; Andrade, G. C.; Ferreira, C. A. 421-12
+	Ocorrência de larvas de <i>Scyllarus aequinoctialis</i> (Lund, 1793) (Palinura: Scyllaridae), no nordeste do Brasil	Santana, W.; Oliveira, J.E.L.; Pinheiro, A.P.
+	Ocorrência de <i>Planes marinus</i> (Rathbun, 1914) (Decapoda: Brachyura) na ZEE do nordeste brasileiro	Santana, W.; Pinheiro, A.P.

G. brimblecombei, ou psílideo-de-concha, é um inseto sugador semelhante a uma minúscula cigarrinha, que se alimenta da seiva do floema. Esta espécie é de origem australiana que ataca espécies do gênero *Eucalyptus* com preferência por *E. camaldulensis* e *E. tereticornis*. No Brasil, esta praga foi detectada em junho de 2003, no estado de São Paulo, porém atualmente está presente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Os sinais da presença da praga são: presença de conchas (cones brancos) na superfície da folha, folhas com aspecto molhado e pegajoso devido aos excrementos açucarados expelidos pelos insetos e presença de fumagina (fungo preto). Seus danos são: redução e deformação do limbo foliar, redução da área fotossintética devido à presença de conchas e fumagina, queda prematura das folhas, seca dos ponteiros e em ataques severos, ou associados com outros fatores de estresse, podem ocasionar a morte da planta. Em estudos de flutuação populacional, com armadilhas adesivas amarelas, de 25x10 cm, em plantios de eucalipto na região metropolitana de Curitiba, observaram-se a presença do fungo entomopatogênico *Beauveria* sp em adultos mortos. Este fungo pertence ao Reino Mycota, Filo Eumycota, Classe Euteromycetes, Ordem Moniliales e Família Monoliaceae. O gênero *Beauveria* apresenta fiálides com a parte basal dilatada terminando em zigue-zague bem definido ou apenas na parte terminal da mesma. É parasito de diversas espécies de insetos, ficando os indivíduos atacados com o corpo coberto por micélio branco. Por se tratar de um fungo bastante utilizado para controle de insetos-praga no mundo inteiro, e com a detecção deste em *G. brimblecombei*, surge mais uma alternativa para de controle biológico desta praga.