

EFEITO DA ÉPOCA DE SEMEADURA SOBRE ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO FEIJOEIRO COMUM (*Phaseolus vulgaris* L.) EM ALENQUER, MICRORREGIÃO DE SANTARÉM, PA

Aristóteles Fernando Ferreira de OLIVEIRA, Terezinha Xavier BASTOS

RESUMO

Os produtores de feijão da microrregião de Santarém, uma das mais tradicionais do Estado do Pará, procuram, muitas vezes, antecipar ou retardar a época de semeadura, visando obter melhores preços na entressafra ou contornar o problema da mão-de-obra por ocasião da colheita. Esta atitude condiciona plantios feitos fora da época mais apropriada, colocando em risco a produtividade da cultura. Não se tem notícia de algum ensaio de época de semeadura na região com a finalidade de obter respostas para o problema. Assim sendo, a cultivar local canário foi semeada em oito épocas, com intervalos de quinze dias, iniciando-se a 02 de março e com a última época sendo instalada em 17 de junho, num total de oito tratamentos, testados em delineamento de blocos ao acaso com três repetições. O espaçamento foi de 0,50cm x 0,20cm, com densidade de plantas por cova. A adubação foi a recomendada pelo resultado da análise do solo. Os resultados indicaram que o feijoeiro tem uma época mais adequada à sua semeadura, baseada na sua resposta ao ambiente onde foi cultivado.

1. Pesquisadores. EMBRAPA – Amazônia Oriental, Caixa Postal 48, 66017-970, Belém, Pará. E-mail: aristffo@cpatu.embrapa.br