



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Vinculada ao Ministério da Agricultura
Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido - CPATU



**1º Simpósio
do Trópico Úmido**

**1st Symposium
on the Humid Tropics**

**1º Simpósio
del Trópico Humedo**

**RESUMOS
ABSTRACT
RESUMEN**

223

Resumós...

1984

PC-2005.00223



30559-1

m, PA

84



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária — EMBRAPA
Vinculada ao Ministério da Agricultura
Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido — CPATU

1.º SIMPÓSIO DO TRÓPICO ÚMIDO
Belém, PA, 12 a 17 de novembro de 1984

R E S U M O S

Belém, PA
1984

Embrapa

Unidade: AT. Se. de
Valor aquisição: _____
Data aquisição: _____
N.º N. Fiscal/Fatura: _____
Forma de: _____
N.º OC: _____
Origem: Doação
N.º Registro: 0223/05

EMBRAPA-CPATU. Documentos, 31

Exemplares desta publicação podem ser solicitados à:
EMBRAPA-CPATU

Trav. Dr. Enéas Pinheiro s/nº

Caixa Postal, 48

66000. Belém, PA.

Telex: (091) 1210

Simpósio do Trópico Úmido, 1, Belém, PA, 1984.
Resumos. Belém, EMBRAPA-CPATU, 1984.
474p. (EMBRAPA-CPATU. Documentos. 31).

1. Agricultura — Congresso — Trópico. I.
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Cen-
tro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido
Belém, PA. II. Título. III. Série.

CDD: 630.601

TECNOLOGIA DE CRIAÇÃO DE BÚFALOS NO TRÓPICO ÚMIDO BRASILEIRO

Luiz Octávio Danin de Moura Carvalho¹ e
Cristo Nazaré Barbosa do Nascimento¹

Com a introdução do búfalo (*Bubalus bubalis*), em 1895, na ilha de Marajó, Estado do Pará-Brasil, apresentou-se uma nova alternativa para a pecuária do trópico úmido brasileiro, tendo em vista a grande adaptabilidade e produtividade desses animais, principalmente nas condições adversas de pastagem nativa de terra inundável.

A região do trópico úmido brasileiro ocupa uma área de aproximadamente 60 por cento do território nacional e detém o maior rebanho bubalino do Brasil, com 65 por cento do efetivo nacional.

Os índices de produtividade da bubalinocultura no setor de produção são inferiores aos obtidos no setor de pesquisa. Por outro lado, os resultados de pesquisa obtidos pelo Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido-CPATU/EMBRAPA mostram que os índices de produtividade dos bubalinos são bastante superiores aos dos bovinos.

As investigações do CPATU/EMBRAPA revelam que, em condições de pastagem nativa de terra inundável da região do baixo Amazonas, podem-se obter bubalinos machos da raça Mediterrâneo com 402 kg de peso vivo aos dois anos de idade. Também, em pastagem cultivada de canarana erecta lisa, em área inundável de várzea, os machos bubalinos da raça Murrah podem atingir, com apenas um ano e meio de idade, pesos vivos superiores a 450 kg. Quanto à produção de leite, os resultados no setor de pesquisa apresentam médias para búfalas selecionadas do CPATU superiores a 2.600 kg por vaca por lactação.

As ótimas características de produção de carne,

¹ EMBRAPA-CPATU. Caixa Postal 48. CEP 66000. Belém, PA, Brasil.

leite e trabalho dos bubalinos indicam que a criação des
ses animais é uma nova perspectiva para a valorização so
cioeconômica da região e representa uma excelente alternata
tiva para a pecuária do trópico úmido brasileiro.