

## PERFORMANCE PRODUTIVA DE BÚFALOS DO TIPO BAILO, EM CONSERVAÇÃO GENÉTICA

Gláucia Quadros Sapucahy da SILVA<sup>1</sup>; José Ribamar Felipe MARQUES<sup>2</sup>;  
Roseane Pinto MARTINS<sup>1</sup>

O Tipo Baio é um búfalo de coloração pardacenta, apresentando tripla aptidão, ou seja: produção de carne e leite, prestando-se ainda ao trabalho de tração. Constitui uma pequena população com risco de descaracterização e/ou extinção, devido a cruzamentos desordenados com outros grupos bubalinos, necessitando de ações urgentes de conservação. O rebanho é mantido em Banco de Germoplasma "in situ" no Banco de Germoplasma Animal da Amazônia (BAGAM) da Embrapa Amazônia Oriental, em Salvaterra (ilha de Marajó), PA, em regime de monta natural sem estação de cobertura definida. O rebanho Baio conta, no momento, com 97 animais sendo deste total 47 fêmeas. Os dados de eficiência produtiva são: peso médio adulto das fêmeas (PF) –  $494,08 \pm 2,98\text{kg}$  (13); média da idade à primeira cria (IPC) –  $34,81 \pm 2,00$  meses (9); intervalo de partos (IDP) e o período de serviço (PS) –  $381,04 \pm 25,08$  dias (48) e  $71,04 \pm 25,08$  dias (48), respectivamente. A média da vida útil (VU) produtiva, ou seja, o tempo que a fêmea permanece no rebanho produzindo foi de  $14,79 \pm 2,98$  anos (14). A média de peso ao nascer (PN) foi de  $32,91 \pm 2,98\text{kg}$  (136). As médias de circunferência escrotal (CE) com 3, 12 e >42 meses, em centímetro, foram:  $13,5 \pm 2,12$ ;  $17,12 \pm 2,33$  e  $31,3 \pm 1,89$ , respectivamente. A média da produção total de leite ajustada para 305 dias de lactação foi 1.126,14kg. O aumento numérico do rebanho é um grande desafio para este trabalho, pois livrará o grupo do risco de extinção.

<sup>1</sup>Bolsista PIBIC/CNPq /Embrapa Amazônia Oriental, Cx. Postal 48, CEP 66017-970. Belém, PA.

<sup>2</sup>Orientador, Embrapa Amazônia Oriental.