

# **XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA**

FRUTICULTURA: AGRONEGÓCIO DO TERCEIRO MILÊNIO

## **RESUMOS**

**EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL  
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FRUTICULTURA**

**Fortaleza (CE), 25 a 29 de setembro de 2000**

OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO BACURIZEIRO (*Platonia insignis*  
*Mart.*)

Carlos Hans Müller; Walnice Maria Oliveira do Nascimento e José Edmar Urano de Carvalho

O bacurizeiro é uma planta frutífera promissora, pelas amplas possibilidades que apresenta como espécie de uso múltiplo, podendo vir a se constituir, em breve, em nova alternativa de cultura perene para a Amazônia. A ocorrência e distribuição geográfica do bacurizeiro, apresentadas neste trabalho, baseiam-se em grande parte nos levantamentos sobre a vegetação efetuados pelo projeto RADAMBRASIL, por levantamentos em herbáreos, além de informações através de inventários florísticos contidos na literatura. O objetivo é registrar informações sobre a distribuição geográfica do bacurizeiro, visando estudos de disponibilidade genética e coleta de material para definir procedimentos adequados para seu cultivo e conseqüente redução da pressão sobre as populações nativas. Não existem dúvidas sobre a origem amazônica do bacurizeiro, sendo encontrado, no início do século, tanto na margem esquerda como na margem direita do rio Pará, abundante na costa sudeste da ilha de Marajó, onde constitui-se em árvore característica das matas marginais. A área de maior concentração da espécie é o estuário do rio Amazonas. Do Estado do Pará se dispersou em direção ao nordeste do Brasil, alcançando os cerrados e chapadões dos Estados do Maranhão e do Piauí. Na direção sul, a dispersão atingiu os Estados do Tocantins e do Mato Grosso. Na direção norte atingiu o Estado do Amapá embora de forma rara, no Estado do Amazonas chegando a romper as fronteiras do Brasil.

Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Caixa Postal 48, CEP 66017-970, Belém, PA, hans@cpatu.embrapa.br; walnice@cpatu.embrapa.br; urano@cpatu.embrapa.br