

LESÕES NOS CASCOS E CLAUDICAÇÕES EM SUÍNOS PUROS DE PEDIGREE EM IDADE DE COMERCIALIZAÇÃO

JURIJ SOBESTIANSKY¹*, IVO WENTZ¹; PAULO ROBERTO S. DA SILVEIRA¹ e ALFREDO RIBEIRO DE FREITAS¹.

Para avaliar a incidência, o tipo e a localização de lesões nos cascos e sua influência sobre o andar dos suínos, foram examinados clinicamente 1022 reprodutores das raças Duroc, Large White e Landrace em oito exposições realizadas nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Dos animais examinados 38,5% apresentavam claudicações. Foi observada uma freqüência significativamente menor de claudicações e de incidência de lesões nos animais da raça Duroc. A incidência de lesões foi maior ($P < 0,01$) nos membros posteriores e independente da posição do membro, nas unhas externas. Observou-se que a ocorrência de rachaduras na parede lateral da muralha e ao longo da linha branca foram superiores ($P < 0,05$) às demais lesões.

In: Reunião Anual da SBZ, 21., Belo Horizonte, 1984. Anais

PROCI-1984.00036

SOB

1984

SP-1984.00036

* - Apresentador - Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves (CNPSA/EMBRAPA) Caixa Postal D-3 - 89.700 - Concórdia - SC.
1 - Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves (CNPSA/EMBRAPA).