

ALGUNS ASPECTOS DA PUBERDADE E MATURIDADE DE FÉMENAS DA RAÇA CANCHIM, NELORE E MEIO-SANGUE CANCHIM E NELORE (Some puberty and maturity aspects of Canchim, Nelore and their crossbreed).

Feliciano Silva*, A.E.D.; Romano, M.A.; EMBRAPA-UEPAE de São Carlos. 13560-São Carlos-SP.

Objetivando determinar as características fisiológicas à puberdade e maturidade, foram observadas 19 novilhas da raça Canchim, 15 Nelore e 19 meio-sangue Canchim X Nelore (Ca X Ne), criadas à pasto (Andropogônio), sendo os resultados (média ± S):

Parâmetros / Genético	Puberdade			Maturidade		
	Canchim	Nelore	Ca X Ne	Canchim	Nelore	Ca X Ne
Total Animais	19	15	19			-
Observações (Nº)	19	13	19			13
Observações (%)	100,0	76,4	100,0			
Cio Silencioso (%)	-	20,0	16,0			
Idade (meses)	20,8 (4,2)	23,3 (4,0)	21,5 (3,2)	22,7 (4,4)	26,5 (3,9)	25,4 (3,3)
Peso (kg)	314,3 ^a (47,0)	284,8 ^b (39,6)	327,4 ^a (29,6)	356,0 (56,7)	338,0 (18,3)	365,0 (46,8)
Perímetro Toráxico (cm)	156,3 (7,8)	159,1 (8,7)	160,0 (6,1)	161,9 (11,2)	168,7 (16,1)	168,1 (8,6)
Altura Cernelha (cm)	120,0 (8,8)	121,2 (3,4)	125,8 (4,8)	122,1 ^a (5,1)	125,5 ^{ab} (5,1)	128,4 ^b (4,0)
Área Pélvica (cm ²)	111,3 (46,4)	125,2 (42,7)	117,4 (47,9)	119,7 ^a (28,0)	169,0 ^b (27,9)	169,2 ^a (43,7)
Intervalo ciclo Estral (dias)	-	-	-	21,0 ^a (8,8)	20,0 ^a (5,0)	26,9 ^b (9,9)
Duração Cio (horas)				16,7 (7,4)	15,5 (8,8)	17,2 (8,5)
Tempo Ovulação (horas)				28,8 ^a (7,7)	25,7 ^{ab} (5,1)	23,7 ^b (9,9)

À puberdade somente foi observada diferença ($p<0,05$) entre os pesos dos grupos genéticos. À maturidade as novilhas meio-sangue foram mais altas ($p<0,05$) e apresentaram o maior ($p<0,05$) ciclo estral. As novilhas Canchim tiveram menor área pélvica ($p<0,05$) e o maior tempo de ovulação ($p<0,05$). Conclui-se que pelas diferenças observadas, à maturidade, se indicaria um manejo reprodutivo diferenciado.

Palavras chave: Bovino, ciclo estral, tempo ovulação.

Key words: Bovine, estrous cycle, ovulation time.