

TITULO

CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES COM TRIODOETILATO DE GALAMINA

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE SAO CARLOS

RESUMO

A CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES PODE SER REALIZADA COM AGENTE CURARIZANTE COMO O TRIODOETILATO DE GALAMINA (FLAXEDIL), COM DOSES DE 1 A 2MG/KG DE PESO VIVO. A INOCULACAO DEVE SER INTRAMUSCULAR E A IMOBILIZACAO OCORRE DE 7 A 12 MINUTOS APOS, COM DURACAO DE 30 MINUTOS EM MEDIA. O TRIODOETILATO DE GALAMINA PODE SER NEUTRALIZADO TOTAL OU PARCIALMENTE POR ANTICOLINESTERASICOS COMO A PROSTIGMINA NA DOSE DE 1MG PARA 4MG DE FLAXEDIL APLICADO (1ML DE PROSTIGMINA PARA 2ML DE FLAXEDIL), ASSOCIADO A 0,05MG DE SULFATO DE ATROPINA (1ML).

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO

O USO DE ANTIDOTOS NA NEUTRALIZACAO DO AGENTE DE CONTENCAO TRAZ O BENEFICIO DE REPARAR DANOS DE APLICACAO POR DOSE EXCESSIVA OU RAPIDA RECUPERACAO DO ANIMAL APOS O TRABALHO EXECUTADO DECORRENTE DA CONTENCAO.

ABRANGENCIA GEOGRAFICA

PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT RO
RR AL AM PA MA PI PE RN PB CE SE AP AC

USUARIOS

IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES

PRINCIPAIS BENEFICIOS

MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS

HOVAES, A.P.	MESTRE
LAZZERI, L.	DOUTOR
RAMADINHA, R.H.L	MESTRE
CASTILHO, L.M.	MESTRE

PRINCIPAL PUBLICACAO

HOVAES, A.P. DE; RAMADINHA, R.H.L.; LAZZERI, R. & CASTILHO, R.M. CONTENCAO FARMACOLOGICA EM CAES MESTICOS. TRIODOETILATO DE GALINHA. IN: CONGRESSO FLUMINENSE DE MEDICINA VETERINARIA, 4, HITEROI, 1981. ANAIS...