

RECOMENDACAO DE PESQUISA : 078.0106/1

TITULO

CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES COM CLORIDRATO DE XILAZINA A 20% ASSOCIADO AO CLORIDRATO DE KETAMINA A 25%

UNIDADE RESPONSAVEL : UEPAE SAO CARLOS

RESUMO

DESIDRATANDO-SE EM ESTUFA A 70.C AS SOLUCOES COMERCIAIS DE CLORIDRATO DE XILAZINA A 2% (ROMPUM) E CLORIDRATO DE KETAMINA A 5% (KETALAR). ATE ATINGIREM AS CONCENTRACOES DE 20% E 25%, RESPECTIVAMENTE, PODE-SE OBTER A CONTENCAO FARMACOLOGICA DE CAES, INOCULANDO-SE PEQUENAS QUANTIDADES DESSAS SUBSTANCIAS ATRAVES DE DARDOS (SERINGAS AUTOMATICAS).

ESSAS SUBSTANCIAS SAO USADAS ASSOCIADAS, COM DOSES INDISTINTAS DE 2,5 A 5MG/KG DE PESO VIVO QUE TEM TERMOS PRAICOS PERMITE CONTER CAES DE 40KG, COM A INOCULACAO DE 1ML DESSA ASSOCIACAO.

PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO

A CONCENTRACAO DE SUBSTANCIAS PARA CONTENCAO DE ANIMAIS PERMITE USAR DOSES MENORES FACILITANDO A APLICACAO.

ABRANGENCIA GEOGRAFICA

PR RJ SP RS SC BA MG ES GO DF MS MT RO
RR AL AM PA MA PI PE RN PB CE SE AP AC

USUARIOS

IMEDIATOS => AGRICULTORES / CRIADORES
POTENCIAIS => AGRICULTORES / CRIADORES

PRINCIPAIS BENEFICIOS

MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE CAPITAL INVESTIDO

COORDENADOR E PESQUISADORES ENVOLVIDOS

NOVAES, A.P.	MESTRE
LAZZERI, L.	DOCTOR
RAMADINHA, R.H.L.	MESTRE
CASTILHO, L.M.	MESTRE

PRINCIPAL PUBLICACAO

NOVAES, A.P. DE; LAZZERI, L.; RAMADINHA, R.H.L. & CASTILHO, L.M. CONTENCAO FARMACOLOGICA EM CAES MESTICOS COM CLORIDRATO DE KETAMINA A 25% ASSOCIADO AO CLOR. XILAZINA A 20%. IMI CONGRESSO FLUMINENSE MED.VET., 4, NITEROI, 1981. ANAIS...