

ABORTO CAPRINO EN LA REGION SEMI-ARIDA DEL NORDESTE-
DE BRASIL.

ABORTION IN THE SEMI-ARID NORTHEAST REGION
BRAZIL.

Manian, M.M. y Feliciano Silva. A.E.D. EMBRAPA --
Centro Nacional de Investigación sobre Caprino.

En la región semi-árida del Nordeste de Brasil,
el período de gestación coincide con la época seca,
que se caracteriza por la falta de alimentos. Los
animales en su mayoría están desnutridos, el índice
de abortos es alto. Todos los exámenes realizados
para la brucelosis, leptospirosis, fueron negativos.
Se concluyó que los abortos en caprinos son,
debido a las condiciones de explotación en la re-
gión semi-árida, de naturaleza nutricional.

In the semi-arid northeastern region of Brazil,
the gestation period coincides with the dry season
and consequently with a feed scarcity. Thus most
animals suffer from desnutrition and abortion levels
are high. Analysis for brucellosis, leptospirosis,
toxoplasmosis, campilobacteriosis, and mycoplasmosis,
were negative. The conclusion is that abortion
is due to nutritional causes in direct relation
with the semi-arid lands on which the goats
are farmed.

Aborto caprino en la region
1985 SP-SP 01720



ASSUNTOS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

INPC
SETOR ORMA
REG. N.º S-1710
DATA 17 / 05 / 91

UNANIAN, M. M.; SILVA, A. E. D. F. Aborto caprino
en la region semi-árida del nordeste
de Brasil. In: SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE LA EXPLOTACION CAPRINA EN
ZONAS ARIDAS, 1985. Fortaleza, Islas
Canarias. Anais. n.º.

In: SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LA EXPLOTACION
CAPRINA EN ZONAS ARIDAS, 1985. Fortaleza
Islas Canarias. Anais. n.º.

SID/CNPC
EMPRÉSTIMOS COMUTAC
Data Retirada: _____/_____/_____
Data Devolução: _____/_____/_____