

ÉPOCAS DE FLORAÇÃO E REBROTAÇÃO DE GRAMÍNEAS NATIVAS DOS CERRADOS: OBSERVAÇÕES PRELIMINARES.

Semiramis Pedrosa de Almeida*

Espécies da família Gramineae constituem-se no maior componente da dieta de bovinos, na época chuvosa, em áreas de pastagem nativa dos Cerrados. Foram selecionadas 2 áreas, não pastejada e pastejada por bovinos em um cerrado ralo na área do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados - EMBRAPA. Foi constatado na área pastejada, em fase de rebrotação, o consumo das espécies: Axonopus barbigerus, A. marginatus, Echinolaena inflexa (capim flechinha), Elyonurus muticus (capim limão), Paspalum guttatum, Schyzachyrium tenerum, além de espécies dos gêneros Mesosetum e Trachypogon. Observou-se que o número de espécies que floresceram na área não pastejada foi maior que o encontrado na área pastejada. Floresceram na área pastejada: Axonopus barbigerus, A. marginatus, Ctenium chapadense, Digitaria aff. Sacchariflora, Echinolaena inflexa, Panicum cervicatum, Paspalum gardnerianum, espécies dos gêneros Aristida e Schyzachyrium. Visto que as sementes destas espécies são necessárias para sua dispersão e manutenção no seu ambiente natural, sugere-se a ampliação destas informações pois são de fundamental importância para o manejo destas áreas.

* EMBRAPA/CPAC, Caixa Postal 70.0023, 73.300, Planaltina-DF.