

TIPOS NOMENCLATURAIS DE PLANTAS VASCULARES DEPOSITADOS NO HERBÁRIO IAN DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL – ARISTOLOCHIACEAE Adans.; ASCLEPIADACEAE Borkh.; BOMBACACEAE Kunth; LECYTHIDACEAE A.Rich., MELIACEAE Juss. E MORACEAE Link. Martins, V. L. C.¹; Reis, J. S.²; Martins-da-Silva, R. C. V.². ¹Bióloga/Museu Nacional/UFRJ; ²Embrapa Amazônia Oriental (veramartins@mn.ufrj.br)

O presente trabalho pretende caracterizar e divulgar os exemplares de tipos nomenclaturais depositados no Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental (Belém-PA), o qual conta com uma coleção de 179 mil exemplares, dos quais cerca de dois mil são considerados tipos nomenclaturais. Durante este trabalho, foram catalogados 169 tipos nomenclaturais pertencentes às famílias Aristolochiaceae (2 exemplares), Asclepiadaceae (8), Bombacaceae (11), Lecythidaceae (58), Meliaceae (25) e Moraceae (65 exemplares). Foi realizado levantamento dos espécimens depositados na coleção de tipos, assim como na coleção geral; posteriormente, realizou-se o levantamento bibliográfico das obras *principes* com intuito, de confirmar ou até mesmo, corrigir os *taxa* nas suas devidas designações. Os espécimens foram tipificados, tendo como normas o mais recente Código Internacional de Nomenclatura Botânica e organizados em capas individuais de cartolina vermelha, onde foi anexada uma cópia da obra *principes*. Foram produzidos gráficos expressando a representatividade por região brasileira, por Estado e por família, dentro dos grupos analisados. É apresentada, também, uma listagem de espécies por família, desses tipos com a sua respectiva categorização, incluindo o número de registro no Herbário, o epíteto específico com o respectivo autor, coletor e número, data e local de coleta, além da bibliografia de referência, bem como a fotografia de alguns exemplares. A classificação dada é provisória, cabendo aos especialistas revisar posteriormente a mesma. (Projeto *Dendrogene* – Embrapa Amazônia Oriental/DFID).