

**Avaliação do glifosato na interação entre *Phakopsora pachyrhizi* e *Glycine max* por meio do ácido chiquímico. II: Efeito curativo.**

Matallo, MB<sup>1</sup>; Franco, DAS<sup>1</sup>; Cerdeira, AL<sup>2</sup>; Moura, MAM<sup>1</sup>; Almeida, SDB<sup>1</sup>; Gazziero, DLP<sup>3</sup>; Soares, RM<sup>3</sup>. <sup>1</sup>Laboratório da Ciência das Plantas Daninhas, Instituto Biológico, Campinas, SP. CEP 13092-543; <sup>2</sup>Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna, SP; <sup>3</sup>Embrapa Soja Londrina, PR. matallo@biologico.sp.gov.br. Evaluation of glyphosate in the interaction between soybean rust and soybean yield through the shiquimic acid. I: Curative effect.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito curativo do glifosato no controle da ferrugem asiática da soja e monitorar as alterações fisiológicas por meio do ácido chiquímico. O experimento foi realizado com a soja cv. BRS 243RR em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. A semeadura foi feita em 05/12/07 e as aplicações em 33, 49, 50 e 67 dias após a germinação (DAG). Os tratamentos foram: 49 DAG – 1) Roundup Ready (RR) a 1,11; 2) RR a 2,22; 3) RR a 4,44 p.c. L.ha<sup>-1</sup>; 33 DAG – 4) RR a 1,11; 5) RR a 2,22; 6) RR a 4,44; 7) Cobra + Roundup Transorb (RT) (0,4 + 1,11); 8) Cobra + RT (0,4 + 2,22); 9) Cobra + RT (0,4 + 4,44); 10) Cobra 0,4; 11) RT 1,11 L.ha<sup>-1</sup>; 12) Priori Xtra + Nimbus (0,3 L.ha<sup>-1</sup> + 0,5% v/v); 13) Testemunha; 50 e 67 DAG - 14) RR (1,11 + 1,11 L.ha<sup>-1</sup>). A avaliação da severidade da doença foi realizada em 93 DAG, empregando-se escala de notas, e o teor de ácido chiquímico, segundo Matallo et al. (2006). Pela observação da severidade média da doença, constatou-se que apenas o tratamento 12 foi eficiente. Nenhum tratamento com glifosato provocou o acúmulo do ácido chiquímico, intoxicação nas plantas ou atuou como agente fungicida.