

horticultura brasileira

Revista da
Associação Brasileira de Horticultura
*Journal of the
Brazilian Association for Horticultural Science*

Volume 25, número 1
Agosto, 2007 Suplemento

ISSN 0102-0536



47^o Congresso Brasileiro de Olericultura

IV SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE CUCURBITÁCEAS

Centro Cultural de Eventos do Descobrimento
05 a 10 de agosto de 2007
Porto Seguro - BA

Resgatando e
valorizando
as hortaliças
subutilizadas



HORTICULTURA BRASILEIRA
v.25, n.1supl., Ago. 2007



CPAA-454-74

Produção de biomassa de folhas e caules de três tipos de cajú (*Arrabidaea chica* Verlot.) em função de espaçamentos, nas condições de Manaus - AM.

Josias Pedroso Queiroz⁽¹⁾, João Vitor Camargo⁽²⁾, Rafaely das Chagas Lameira⁽²⁾, Francisco Célio Maia Chaves⁽³⁾, Adrian Martin Pohlit⁽⁴⁾

⁽¹⁾Graduando em Agronomia/Universidade Federal do Amazonas, Bolsista PIBIC/FAPEAM. ⁽²⁾Graduando em Agronomia UFAM, Bolsista PIBIC/CNPq. ⁽³⁾Eng. Agro., Dr., Embrapa Amazônia Ocidental, AM 010, Km 29, Caixa Postal 319, 69.011-970, Manaus - AM. E-mail: celio@cpaa.embrapa.br ⁽⁴⁾Químico, Dr., Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.

Avaliou-se a produção de folhas, caules e relação folha/caule em três tipos de cajú (*Arrabidaea chica* Verlot.), em função de arranjos espaciais (0,5 x 0,5 m; 0,5 x 1,0 m; 1,0 x 1,0 m; 1,0 x 1,5 m e 1,5 x 1,5 m). A produção de folhas foi crescente nos Tipos 2 e 3, em função dos maiores espaçamentos. Já a produção de caules cresce em todos os tipos até o espaçamento 1,0 m x 1,0 m. Verificou-se que o tipo 1 deve ser recomendado para cultivo em espaçamentos intermediários, enquanto os demais tipos respondem melhor em espaçamentos maiores.