

## INTRODUÇÃO

Extensas áreas do estado de Rondônia apresentam solos de baixa e média fertilidade natural, onde predominam o modelo de agricultura itinerante, caracterizado pelo binômio derruba e queima. Aliado a outros fatores, é notável o declínio gradual da produtividade das culturas anuais e/ou perenes, reflexo da diminuição da fertilidade do solo, perdas de matéria orgânica, infestação de plantas invasoras e a deficiente reciclagem de nutrientes no solo, o que contribui para o abandono de áreas agrícolas ou sua transformação em pastagens. Desse modo, torna-se necessário o desenvolvimento de sistemas agrícolas mais sustentáveis sob o ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental. A utilização de leguminosas arbóreas ou arbustivas na recuperação de solos degradados e na melhoria daqueles de baixa fertilidade natural tem sido uma prática bastante usual nas regiões tropicais, notadamente em áreas destinadas à produção de alimentos básicos. Com a busca de alternativas de uso da terra na Amazônia Ocidental tem crescido a importância dos sistemas agroflorestais (SAF's) e a demanda por espécies de múltiplos propósitos.

Neste trabalho avaliou-se o desempenho agrônômico de leguminosas arbóreas e arbustivas de uso múltiplo, visando selecionar as mais promissoras para a composição de SAF's nas condições ecológicas de Porto Velho, Rondônia.

## MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa Rondônia, localizado no município de Porto Velho (96,3 m de altitude, 8°46' de latitude sul e 63°51' de longitude oeste), durante o período de março de 1992 a março de 1994. O clima da região é tropical do tipo Am, com temperatura média de 24,5°C, precipitação entre 2.000 e 2.500 mm, com estação seca bem definida (junho a setembro) e umidade relativa do ar em torno de 89%. O solo da área experimental é um Latossolo Amarelo, textura argilosa, com as seguintes características químicas: pH em água (1/2,5) = 3,8; Al = 2,44 cmol/dm<sup>3</sup>; Ca + Mg = 0,51 cmol/dm<sup>3</sup>; P = 1 mg/kg e K = 23 mg/kg.

O tipo de plantio, denominado Demonstration Forests, consistiu de parcelas não repetidas de 14 espécies de leguminosas arbóreas e arbustivas, conforme previsto no Programa Colaborativo entre a Embrapa Rondônia e Nitrogen Fixing Tree Association (NFTA, Hawaii, USA) para a avaliação de leguminosas arbóreas fixadoras de nitrogênio nas regiões tropicais do planeta. As parcelas experimentais constaram de 16 plantas, sendo as quatro centrais utilizadas como área útil. As sementes de todas as espécies avaliadas foram inoculadas com *Rhizobium* específico, as quais foram plantadas em sacolas plásticas e, posteriormente transplantadas para o local definitivo, não sendo utilizado, nas duas operações, nenhum tipo de fertilização química ou orgânica. O espaçamento entre plantas foi de 2 x 2 m. Os parâmetros avaliados foram taxa de sobrevivência, altura das plantas, diâmetro basal e diâmetro à altura do peito (DAP).

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

A taxa de sobrevivência, aos seis meses de idade, foi de 100% para todas as espécies avaliadas; aos 12 meses, as espécies de *Leucaena* e *D. gyroides* apresentaram uma sobrevivência de 93%, ocorrendo, aos 18 e 24 meses, uma mortalidade de 100% de suas plantas, evidenciando a baixa adaptabilidade destas espécies às condições edafoclimáticas locais. Independentemente das épocas de

<sup>1</sup> Eng. Agr., M.Sc., Embrapa Amapá, Caixa Postal 10, Macapá, Amapá.

<sup>2</sup> Zootec., M.Sc., Embrapa Rondônia.

<sup>3</sup> Med. Vet., M.Sc., Embrapa Rondônia.

<sup>4</sup> Eng. Flor., M.Sc., Embrapa Rondônia.

avaliação, as leguminosas que apresentaram plantas com maior altura foram *A. angustissima*, *I. edulis*, *A. saman*, *A. pavonina* e *C. racemosa* (Tabela 1). O crescimento dessas espécies pode ser considerado satisfatório, considerando-se as condições ambientais a que estavam submetidas, notadamente a baixa fertilidade natural do solo. As alturas de plantas registradas para *A. angustissima* e *A. lebbek* superaram em 33 e 139%, respectivamente, aquelas relatadas por Carvalho et al. (1994) para as mesmas espécies estabelecidas em um Latossolo Vermelho-Amarelo. Do mesmo modo, Locatelli et al. (1992), avaliando 11 espécies de leguminosas arbóreas e arbustivas, em condições edafoclimáticas semelhantes, constataram um excelente desempenho, em termos de taxa de sobrevivência e altura de plantas para *A. angustissima* e *I. edulis*.

Aos seis e 12 meses de idade, os maiores DAP foram registrados por *A. angustissima*, *I. edulis* e *A. pavonina*; aos 18 e 24 meses *A. angustissima*, *I. edulis*, *A. pavonina* e *C. racemosa* apresentaram plantas com maiores DAP (Tabela 2). Os valores verificados com estas espécies foram superiores aos reportados por Leal e Ramos (1994) para *A. angustissima* e *C. calothyrsus* e por Carvalho et al. (1994) para *A. lebbek*.

Durante o período de 24 a 30 meses, o incremento tanto em altura quanto em diâmetro das espécies sobreviventes foram baixos, com destaque apenas para os registrados com *C. racemosa* para altura e DAP e para *A. angustissima* para o DAP (Tabela 3). Tal comportamento pode estar diretamente relacionado com a baixa disponibilidade de nutrientes no solo.

## CONCLUSÕES

As espécies avaliadas apresentaram respostas distintas às condições edafoclimáticas a que foram submetidas; considerando-se as taxas de sobrevivência e o crescimento em altura e diâmetro, as leguminosas mais promissoras para a composição de sistemas agroflorestais foram *A. angustissima*, *I. edulis*, *C. racemosa*, *A. saman* e *A. pavonina*.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CARVALHO, M.M. de; FRANCO, A.A.; FREITAS, V. de P.; XAVIER, D.F. Avaliação do crescimento inicial de leguminosas arbóreas para associação com pastagens na região Sudeste. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 1., 1994, Porto Velho. *Anais...* Colombo: EMBRAPA-CNPf, 1994, p.165-172. (EMBRAPA-CNPf. Documentos, 27).
- LEAL, A.C.; RAMOS, A.L.M. Introdução e avaliação preliminar de espécies florestais de uso múltiplo no norte do Paraná. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 1., 1994, Porto Velho. *Anais...* Colombo: EMBRAPA-CNPf, 1994, p.229-232. (EMBRAPA-CNPf. Documentos, 27).
- LOCATELLI, M.; VIEIRA, A.H.; PALM, C.A. Seleção de leguminosas para cultivo em *Alley-Cropping* sob condições de Latossolo Amarelo. In: MESA REDONDA SOBRE RECUPERAÇÃO DE SOLOS ATRAVÉS DO USO DE LEGUMINOSAS, 1991, Manaus. *Trabalhos e recomendações*. Belém: EMBRAPA-CPATU/GTZ, 1992. p.121-130. (EMBRAPA-CPATU. Documentos, 67).